

[高吐]シスプラチン+エトポシド療法(入院)

外科 管理番号 D413

処方医: [ ]

適応症: 小細胞肺癌

3~4週を1コースとし4コース繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
シスプラチン	●																					●
エトポシド	●	●	●																			●

身長: [ ] cm 体重: [ ] kg 体表面積 [ ] m<sup>2</sup>

[投与スケジュール] ( [ ] クール目)

Day1 ( [ ] 月 [ ] 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
ラクテック注500mL [2時間 点滴静注]	1袋		
ラクテック注500mL [2時間 点滴静注]	1袋		

アロキシ点滴静注用バッグ0.75mg デキサート注 [30分 点滴静注]	1袋 9.9mg
生食500mL エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> [2時間 点滴静注][炎症性] アレルギー症状注意	1袋
生食500mL(全満量注意) シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> [2時間 点滴静注][炎症性] アレルギー症状注意複数回以上数分以内	1瓶

ラクテック注500mL [2時間 点滴静注]	1袋
マンニトールS 300mL [1時間 点滴静注]	1瓶
フロセミド注20mg [静注]	1管
ラクテック注500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day2 ( [ ] 月 [ ] 日) Day3 ( [ ] 月 [ ] 日)

薬剤名	投与量
ラクテック注500mL [2時間 点滴静注]	1袋
ラクテック注500mL [2時間 点滴静注]	1袋
生食100mL デキサート注 [30分 点滴静注]	1瓶 8.25mg
生食500mL エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> [2時間 点滴静注][炎症性] アレルギー症状注意	1袋
生食20mL [静注]	1管

[適正使用基準]

1. PS(Performance Status)が0~2である。
- \*2. 重症感染症またはその疑い(CRP異常、発熱、白血球異常増多)がない。
3. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。

血液一般検査	*WBC (/μL)	4000 ≤	
	*Neut (/μL)	2000 ≤	
	*PLT (/μL)	15万 ≤	
	HGB (g/dL)	11.0 ≤	
	BUN (mg/dL)	≤25	
血清生化学検査	GOT (IU/L)	≤40	
	GPT (IU/L)	≤35	
	TBil (mg/dL)	≤1.5	
	BUN (mg/dL)	≤25	

[DLF]

シスプラチン: 腎障害・悪心・嘔吐・骨髄抑制  
 エトポシド: 白血球および好中球減少  
 シスプラチン: 腎障害時用量調節  
 エトポシド 肝腎障害時用量調節

	Cr (mg/dL)	≤ 1.5	
	Ccr (mL/min)	60 ≤	
	Mg	1.7-2.5	

	今回	累積
シスプラチン	_____ mg	_____ mg
エトポシド	_____ mg	_____ mg
エトポシド	_____ mg	_____ mg
エトポシド	_____ mg	_____ mg

《シスプラチン減量基準》

Ccr > 60: 減量なし

Ccr = 30 ~ 60: 50%減量

Ccr < 30: 中止

《エトポシド減量基準》

Ccr > 50: 減量なし

Ccr = 10 ~ 50: 25%減量

Ccr < 10: 50%減量

TBIL 1.5 ~ 3.0 または GOT 60 ~ 180: 50%減量

TBIL 3以上 または GOT 180以上: 中止

[DLFを除く重大な副作用]

《シスプラチン》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状【発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等】
- ・聴力低下・難聴・耳鳴【聴力低下・難聴・耳鳴】
- ・うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲【視力低下・中心暗点・眼痛】
- ・脳梗塞【意識障害・頭痛】
- ・溶血性尿毒症症候群【紫斑・むくみ・尿量低下】
- ・心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈【胸痛・息切れ・動悸・心電図異常等】
- ・溶血性貧血【めまい・たちくらみ・倦怠感】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群【むくみ・痙攣・意識障害】
- ・劇症肝炎、肝機能障害、黄疸【食欲不振・倦怠感・黄疸】
- ・消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔【腹痛・嘔吐・吐血・下血】
- ・急性膵炎【腹痛・腰背痛】
- ・高血糖、糖尿病の悪化
- ・横紋筋融解症【筋肉痛・コーラ尿】

《エトポシド》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状【チアノーゼ・呼吸困難・胸内苦悶・血圧低下等】
- ・間質性肺炎【発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常・好酸球増多等】