

# シスプラチン+ゲムシタビン療法

外科: 管理番号 D418

処方医

適応: 非小細胞肺癌

3週を1コースとし投与を3~4コースくりかえす

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	●																				
GEM	●							●													

身長: \_\_\_\_\_ cm 体重: \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

DAY 1 ( 月 日 )

薬剤名	投与量		
ラクテック500mL	1袋	2時間	
ラクテック500mL	1袋	2時間	
アロキソ点滴静注ハック0.75mg	1袋	30分	
デキサート	9.9mg		
生食 100mL	1瓶	30分	24Gにてルート確保 (炎症)
ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>			
生食 500mL (全満量注意)	1瓶	2時間	アレルギー症状注意 6~8回以上はば数分以内 (炎症)
シスプラチン注 80mg/m <sup>2</sup>			
ラクテック500mL	1袋	2時間	
マンニトールS	1袋	1時間	
フロセミド注20mg	1管	静注	
ラクテック500mL	1袋	2時間	薬剤師:

DAY 2 ( 月 日 )

DAY 3 ( 月 日 )

薬剤名	投与量		
生食100mL	1瓶	30分	
デキサート	8.25mg		
ラクテック500mL	1袋	2時間	
ラクテック500mL	1袋	2時間	

DAY 8 ( 月 日 )

薬剤名	投与量		
生食100mL	1袋	30分	
デキサート	6.6mg		
生食 100mL	1瓶	30分	24Gにてルート確保 (炎症)
ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>			
生食 20mL	1瓶	静注	薬剤師:

[適性使用基準]

[DLF] CDDP: 腎障害、骨髄抑制  
悪心・嘔吐

GEM: 骨髄抑制

- \*1. 重篤な骨髄抑制がない
- 2. 胸部単純X線写真で明らかで、かつ臨床症状のある間質性肺炎又は肺線維症ではない
- 3. 胸部への放射線療法を施行していない
- \*4. 重症感染症を合併していない
- \*5. 重篤な腎障害がない
- 6. 本剤の成分又は他の白金を含む薬剤に対し過敏症がない
- 7. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。

	投与基準		DAY8
	DAY1 初回コース	第2コース	
PS	0~1	2以下	—
発熱(感染)	38°C未満	感染を伴う発熱(38°C以上)が無い	—
* WBC	》4000かつ 《12000	》3000または好 中球数《1500	》2000
* 血小板数	10万以上		7.5万以上
* ヘモグロビン値	》9.5	—	—
AST(GOT)	<100		—
ALT(GPT)	<100		—
TBIL	≤2		—

血清クレアチニン	≦施設正常値上限	—
Ccr	≧60	—

		投与基準	
末梢神経障害	—	≦Grade2	悪心・嘔吐、 脱毛、食欲不振 を除く非血液毒 性 ≦Grade2
筋肉痛・関節痛	—	≦Grade2	
肺毒性	—	≦Grade1	
心毒性	—	≦Grade1	
投与量変更基準			
項目		GEM投与量	CDDP投与量
WBC	<1000	1000→800	80(変更なし)
血小板数	<20000		
38℃以上の発熱を伴うGrade3以上の好中球減少		1000→800	80(変更なし)
施設正常値上限×1.5以上の血清クレアチニン上昇		1000(変更なし)	80→60
Grade3以上の非血液学的毒性(悪心・嘔吐、脱毛、食欲不振を除く)		1000→800	80→60
Grade2以上の末梢神経障害、筋肉痛・関節痛		1000(変更なし)	80→60

CDDP減量基準

Ccr>60:減量なし

Ccr=30~60:50%減量

Ccr<30:中止

ゲムシタビン

[今回の投与量] \_\_\_\_\_ mg [累積投与量] \_\_\_\_\_ mg

[今回の投与量] \_\_\_\_\_ mg [累積投与量] \_\_\_\_\_ mg

CDDP

[今回の投与量] \_\_\_\_\_ [累積投与量] \_\_\_\_\_ mg

[DLFを除く重大な副作用]

《CDDP》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等]
- ・聴力低下・難聴・耳鳴 [聴力低下・難聴・耳鳴]
- ・うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲 [視力低下・中心暗点・眼痛]
- ・脳梗塞 [意識障害・頭痛] ・一過性脳虚血発作
- ・溶血性尿毒症症候群 [紫斑・むくみ・尿量低下]
- ・心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈 [胸痛・息切れ・動悸・
- ・溶血性貧血 [めまい 心電図異常等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 [むくみ・痙攣・意識障害]
- ・劇症肝炎、肝機能障害、黄疸 [食欲不振・倦怠感・黄疸]
- ・消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔 [腹痛・嘔吐・吐血・下血]
- ・急性膵炎 [腹痛・腰背痛]
- ・高血糖、糖尿病の悪化
- ・横紋筋融解症 [筋肉痛・コーラ尿]

《ゲムシタビン》

- ・アナフィラキシー様症状 [呼吸困難等]
- ・心筋梗塞 [胸痛・呼吸困難等]
- ・溶血性尿毒症症候群 [紫斑・むくみ・尿量低下等]
- ・肺水腫 [呼吸困難・チアノーゼ等]
- ・うっ血性心不全 [息苦しさ・むくみ・胸痛等]
- ・腎不全 [むくみ・尿量低下等]
- ・気管支痙攣 [呼吸困難・喘鳴等]
- ・成人呼吸促迫症候群(ARDS) [呼吸困難等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]