

# [高吐]シスプラチン+ロゼウス(ナベルピン)療法

外科 管理番号 D412

処方医:

適応症: 非小細胞肺癌

3週毎に3~6コース繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
シスプラチン	●																					
ロゼウス	●							●														

身長: \_\_\_\_\_ cm 体重: \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

[投与スケジュール] ( \_\_\_\_\_ クール目)

Day1( 月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋		
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋		
アロキン点滴静注バッグ0.75mg デキサート注 [30分 点滴静注]	1袋 9.9mg		
生食100mL [ロゼウス投与中の逃げ道用 ロゼウス投与開始から終了まで 点滴静注]	1袋	生食50mL ロゼウス25 mg/m <sup>2</sup> [全開][壊死性]	1袋 <span style="float: right;">プライミング</span>
生食20mL [静注] ルート内洗浄	1管		
		生食500mL (全満量注意) シスプラチン80 mg/m <sup>2</sup> [2時間 点滴静注][炎症性] アレルギー症状注意6~8回以上 上ほぼ数分以内	1袋 <span style="float: right;">プライミング</span>

ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
マンニトールS300mL [1時間 点滴静注]	1袋
フロセミド注20mg [静注]	1管
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day2( 月 日) Day3( 月 日)

本管	
薬剤名	投与量
生食100mL デキサート注 [30分 点滴静注]	1瓶 8.25mg
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day8( 月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食 100mL [ロゼウス投与中の逃げ道用 ロゼウス投与開始から終了まで 点滴静注]	1瓶	生食50mL ロゼウス 25mg/m <sup>2</sup> [全開] 静脈確保を確認後、開始 [壊死性]	1瓶 <span style="float: right;">プライミング</span>
生食20mL [静注]ルート内洗浄	1管		

生食250mL [1時間 点滴静注]	1瓶
-----------------------	----

[今回の投与量]	[累積投与量]	[DLF]
ロゼウス: mg	ロゼウス: mg	ロゼウス:
シスプラチン: mg	シスプラチン: mg	白血球および好中球減少
[今回の投与量]	[累積投与量]	シスプラチン
ロゼウス: mg	ロゼウス: mg	腎障害・悪心・嘔吐・骨髄抑制
		シスプラチン 腎障害時用量調節
		ロゼウス: 肝障害時用量調節

[適正使用基準]

1. PS (Performance Status)が0～2である			
2. 重篤な感染症を合併していない			
3. 髄腔内投与でない			
4. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。			
5. 機能障害を伴う重度の感覚異常又は知覚不全がない			
6. PS (Performance Status)が0～2である			
7. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。			
血液一般検査	WBC	(/μL)	4000 ≤
	Neut	(/μL)	1600 ≤
	PLT	(/μL)	15万 ≤
	HGB	(g/dL)	11.0 ≤
血清生化学検査	AST	(IU/L)	≤40
	ALT	(IU/L)	≤35
	TBil	(mg/dL)	≤1.2
	BUN	(mg/dL)	≤20
	Cr	(mg/dL)	≤1.1
	Mg		1.7-2.5

[骨髄抑制を考慮した投与量の調節]

ロゼウス: 投与延期: WBC2000以下 Neut1000以下

TBIL2. 0～3.0	50%減量
TBIL3. 1～5.0	75%減量
TBIL5>	中止

《シスプラチン減量基準》

Ccr>60: 減量なし

Ccr=30～60: 50%減量

Ccr<30: 中止

[DLFを除く重大な副作用]

《ロゼウス》

- ・間質性肺炎、肺水腫 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・気管支痙攣 [息切れ・呼吸困難等]
- ・麻痺性イレウス [腹痛・腹部膨満感]
- ・心不全、心筋梗塞、肺塞栓症 [むくみ・息苦しさ・胸痛・呼吸困難・チアノーゼ]
- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [発疹・呼吸困難・血圧低下等]
- ・肺塞栓症 [呼吸困難等]
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) [むくみ・痙攣・意識障害等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]
- ・急性膵炎 [腹痛・血清アミラーゼ値上昇等]

《シスプラチン》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等]
- ・聴力低下・難聴・耳鳴 [聴力低下・難聴・耳鳴]
- ・うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲 [視力低下・中心暗点・眼痛]
- ・脳梗塞 [意識障害・頭痛]
- ・溶血性尿毒症症候群 [紫斑・むくみ・尿量低下]
- ・心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈 [胸痛・息切れ・動悸・心電図異常等]
- ・溶血性貧血 [めまい・たちくらみ・倦怠感]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]

- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群【むくみ・痙攣・意識障害】
- ・劇症肝炎、肝機能障害、黄疸【食欲不振・倦怠感・黄疸】
- ・消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔【腹痛・嘔吐・吐血・下血】
- ・急性膵炎【腹痛・腰背痛】
- ・高血糖、糖尿病の悪化