

[高吐]シスプラチン+S-1+放射線併用療法

外科 管理番号 RSF059

処方医:

適応症: 切除不能局所進行非小細胞肺癌

CDDP: day1に投与、4週毎

S-1: day1-14内服、day15-28休薬、4週毎

放射線治療: 60Gy/30回(6週)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
シスプラチン	●																					
S-1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
放射線照射	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
シスプラチン								●														
S-1								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
放射線照射	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m²

[投与スケジュール] (_____ クール目)

Day1(月 日) Day29(月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋		
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋		

アロキシ点滴静注バッグ0.75mg デキサート注 [30分 点滴静注]	1袋 9.9mg
---	-------------

生食500mL (全満量注意) シスプラチン 60mg/m ² [2時間 点滴静注][炎症性] アレルギー症状注意6~8回以上 上ほぼ数分以内	1袋
--	----

ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
マンニトールS300mL [1時間 点滴静注]	1袋
フロセミド注20mg [静注]	1管
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day2(月 日)~Day3(月 日) Day30(月 日)~Day31(月 日)

本管	
薬剤名	投与量
生食100mL デキサート注 [30分 点滴静注]	1瓶 8.25mg
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day1(月 日)~Day14(月 日) Day29(月 日)~Day42(月 日)

薬剤名	投与量
S-1 80mg/m ² (内服)	2×朝夕食後

[適正使用基準]

1. PS(Performance Status)が0~2である
2. 重篤な感染症を合併していない
3. 髄腔内投与でない
4. 機能障害を伴う重度の感覚異常又は知覚不全がない
5. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。

[DLF]

シスプラチン 腎障害・悪心・嘔吐・骨髄抑制

シスプラチン 腎障害時用量調節

6. 5-FUを投与されていない			
7. フルシトシンを投与されていない			
8. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。			
血液一般検査	WBC	(/μL)	4000 ≤
	Neut	(/μL)	1600 ≤
	PLT	(/μL)	15万 ≤
	HGB	(g/dL)	11.0 ≤
血清生化学検査	AST	(IU/L)	≤40
	ALT	(IU/L)	≤35
	TBil	(mg/dL)	≤1.2
	BUN	(mg/dL)	≤20
	Cr	(mg/dL)	≤1.1
	Mg		1.7-2.5

[今回の投与量]
シスプラチン mg
[累積投与量]
シスプラチン mg

[今回の投与量]
シスプラチン mg
[累積投与量]
シスプラチン mg

《腎機能を考慮したシスプラチン投与量の調整》

Ccr>60:減量なし

Ccr=30~60:50%減量

Ccr<30:中止

S-1

Ccr (mL/min)	80>	50-80	30-50	<30
S-1	減量なし	20%減量	30%減量	中止

[DLFを除く重大な副作用]

《シスプラチン》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状【発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等】
- ・聴力低下・難聴・耳鳴【聴力低下・難聴・耳鳴】
- ・うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲【視力低下・中心暗点・眼痛】
- ・脳梗塞【意識障害・頭痛】
- ・溶血性尿毒症症候群【紫斑・むくみ・尿量低下】
- ・心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈【胸痛・息切れ・動悸・心電図異常等】
- ・溶血性貧血【めまい・たちくらみ・倦怠感】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群【むくみ・痙攣・意識障害】
- ・劇症肝炎、肝機能障害、黄疸【食欲不振・倦怠感・黄疸】
- ・消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔【腹痛・嘔吐・吐血・下血】
- ・急性膵炎【腹痛・腰背痛】
- ・高血糖、糖尿病の悪化

《S-1》

- ・脱水症状
- ・重篤な腸炎
- ・間質性肺炎
- ・重篤な口内炎、消化管潰瘍、消化管出血、消化管穿孔
- ・急性腎不全
- ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症
- ・白質脳症
- ・臭覚脱失
- ・眼症状(流涙、充血、かすみ目)