

[高吐]シスプラチン+ドセタキセル+放射線併用療法

外科 管理番号 RSF052

処方医:

適応症: 非小細胞肺癌、stage III

CDDP/DTX: day1,8,29,36に投与する

放射線治療: 60Gy/30回(6週)、day1~

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	●							●													
ドセタキセル	●							●													
放射線照射	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
シスプラチン								●							●						
ドセタキセル								●							●						
放射線照射	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m²

[投与スケジュール] (_____ クール目)

Day1(月 日) Day8(月 日) Day29(月 日) Day36(月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋		
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋		

		アロシ点滴静注ハッグ0.75mg デキサート注 [30分 点滴静注]	1袋 9.9mg
--	--	--	-------------

生食100mL [1時間 点滴静注]	1瓶	生食250mL ドセタキセル 40mg/m ² [1時間 点滴静注][壊死性] アレルギー症状注意 特に初~2回投与時 ほぼ10分 以内 投与中1時間観察	1袋
-----------------------	----	---	----

		生食500mL (全満量注意) シスプラチン 40mg/m ² [2時間 点滴静注][炎症性] アレルギー症状注意6~8回以 上ほぼ数分以内	1袋
--	--	---	----

プライミング

ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
マンニトールS300mL [1時間 点滴静注]	1袋
フロセミド注20mg [静注]	1管
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day2(月 日)~Day3(月 日) Day9(月 日)~Day10(月 日)

Day30(月 日)~Day31(月 日) Day37(月 日)~Day38(月 日)

本管	
薬剤名	投与量
生食100mL デキサート注 [30分 点滴静注]	1瓶 8.25mg
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋

[今回の投与量]

ドセタキセル mg

シスプラチン mg

[累積投与量]

ドセタキセル mg

[今回の投与量]

ドセタキセル mg

シスプラチン mg

[累積投与量]

ドセタキセル mg

[今回の投与量]

ドセタキセル mg

シスプラチン mg

[累積投与量]

ドセタキセル mg

[今回の投与量]

ドセタキセル mg

シスプラチン mg

[累積投与量]

ドセタキセル mg

シスプラチン	mg	シスプラチン	mg	シスプラチン	mg	シスプラチン	mg
--------	----	--------	----	--------	----	--------	----

[DLF]

ドセタキセル
好中球減少
シスプラチン
腎障害・悪心・嘔吐・骨髄抑制
シスプラチン 腎障害時用量調節

[適正使用基準]

1. PS (Performance Status)が0~2である
2. 重篤な感染症を合併していない
3. 髄腔内投与でない
4. 機能障害を伴う重度の感覚異常又は知覚不全がない
5. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。

血液一般検査	WBC	(/μL)	4000 ≤				
	Neut	(/μL)	1600 ≤				
	PLT	(/μL)	15万 ≤				
	HGB	(g/dL)	11.0 ≤				
血清生化学検査	AST	(IU/L)	≤40				
	ALT	(IU/L)	≤35				
	TBil	(mg/dL)	≤1.2				
	BUN	(mg/dL)	≤20				
	Cr	(mg/dL)	≤1.1				
	Mg		1.7-2.5				

《腎機能を考慮したシスプラチン投与量の調整》

Ccr > 60: 減量なし

Ccr = 30~60: 50%減量

Ccr < 30: 中止

[DLFを除く重大な副作用]

《ドセタキセル》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状【呼吸困難・気管支痙攣・血圧低下・胸部圧迫感・発疹等】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・心不全【呼吸困難・むくみ等】
- ・播種性血管内凝固症候群(DIC)
- ・腸管穿孔、胃腸出血【腹痛・吐血・下血等】
- ・浮腫・体液貯留
- ・心筋梗塞【胸痛・呼吸困難等】

《シスプラチン》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状【発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等】
- ・聴力低下・難聴・耳鳴【聴力低下・難聴・耳鳴】
- ・うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲【視力低下・中心暗点・眼痛】
- ・脳梗塞【意識障害・頭痛】
- ・溶血性尿毒症症候群【紫斑・むくみ・尿量低下】
- ・心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈【胸痛・息切れ・動悸・心電図異常等】
- ・溶血性貧血【めまい・たちくらみ・倦怠感】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群【むくみ・痙攣・意識障害】
- ・劇症肝炎、肝機能障害、黄疸【食欲不振・倦怠感・黄疸】
- ・消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔【腹痛・嘔吐・吐血・下血】
- ・急性膵炎【腹痛・腰背痛】
- ・高血糖、糖尿病の悪化