

カルボプラチン+アリムタ(ペトレキセド)+アバスチン(ペバシズマブ)併用療法

外科: 管理番号 D430
処方医 適応: 非小細胞肺がん
3週を1コースとし4-6サイクル

Calendar grid showing treatment days for Panbitan, Carboplatin, Arimata, Abastin, Mechocobal, and Decadron from Day 1 to Day 22.

身長: cm 体重: kg 体表面積 m^2

[投与スケジュール] (クール目)

アリムタ投与日1週間前

Table with columns: 薬剤名, 投与量, 投与方法. Includes Panbitan (1g) and Mechocobal (2管).

Day1 (月 日)

Table for Day 1 treatment details, including main and side tubes with drug names and dosages like Glicortone, Dexatone, and Carboplatin.

DAY 2 (月 日)

DAY 3 (月 日)

Table for Day 2 and 3 treatment details, including Decadron (8mg).

* 初回投与時は90分 初回の認容性が良好であれば2回目の投与は60分間でなくてもよい。
2回目の投与においても認容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与することができる。

Table with 13 rows of clinical criteria for treatment continuation, such as PS status, hemoglobin, infection, and organ function.

Table for side effects and monitoring, including DLF (DLF), Carboplatin (white blood cells, bone marrow), and Arimata (bone marrow).

	HGB (g/dL)	8.0以上が望ましい
	GOT (IU/L)	82.5以下が望ましい
	GPT (IU/L)	105以下が望ましい
	TBil (mg/dL)	1.95以下が望ましい
	Cr (mg/dL)	1.05以下が望ましい
	Ccr (mL/min)	45以上
	タンパク尿	2+で投与可
心電図検査		異常がないことが望ましい
肺機能検査 PO2		60Torr以上が望ましい
動脈血酸素飽和度(SPO2)		92%以上

[次コース開始基準]

4. PS:0~2			
血液一般検査	Neut (/μL)	2000以上	
	PLT (/μL)	10万以上	
	HGB (g/dL)	9.0以上	
	TBIL (mg/dL)	1.95以下	Grade3以上の副作用が認められた場合は、第1コース開始前のGradeまで回復していること
	GOT (IU/L)	82.5以下	
	GPT (IU/L)	105以下	
	Cr (mg/dL)	1.2以下	
	Ccr (mL/min)	45以上	
タンパク尿	2+で投与可		

[減量基準]

血液毒性	Grade4の白血球数減少(1000未満)または好中球数減少(500未満) 25000未満の血小板数減少または血小板輸血を実施した場合 38度以上の発熱を伴うGrade3(1000未満)以上の好中球数減少	400mg/m ²
非血液毒性	Grade3以上 Grade3の悪心、嘔吐、疲労、食欲不振 GOT・GPT上昇については減量不要の場合あり	
投与延期	本剤により発現した副作用により、次コースの開始が前コースの第30日以降に延期された場合	

[重大な副作用]

《アバステン》

- ・消化管穿孔(突然起こる強い腹痛)
- ・創傷治癒遅延
- ・原発巣からの出血(下血)
- ・肺転移巣からの出血(喀血)
- ・脳転移巣からの出血(突発性の意識障害、神経障害、頭痛、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・動脈血栓塞栓(胸痛)
- ・動脈血栓塞栓(突発性の意識障害、神経症状、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・高血圧に伴う緊急症(頭痛、視力障害、意識障害、悪心・嘔吐)
- ・可逆性後白室脳症症候群
- ・ネフローゼ症候群(蛋白尿)
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・好中球減少症
- ・うっ血性心不全(呼吸困難、乏尿、体重の変化)

《アリムタ》

- ・骨髄抑制
- ・間質性肺炎
- ・重度の下痢
- ・脱水
- ・腎不全

《カルボプラチン》

- ・汎血球減少等の骨髄抑制
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
【チアノーゼ・呼吸困難・胸内苦悶・血圧低下等】
- ・脳梗塞【頭痛・意識障害等】
- ・急性腎不全【むくみ・尿量低下・検査値異常等】
- ・麻痺性イレウス
【食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等】
- ・間質性肺炎【発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常等】
- ・溶血性尿毒症症候群【血尿・貧血・検査値異常等】
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全
【胸痛・むくみ・呼吸困難・チアノーゼ等】

]