

カルボプラチン・アブラキサン療法

外科 管理番号 D441

処方医:

適応: 非小細胞肺癌 4週ごとにくりかえす

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
アブラキサン	●							●							●														
カルボプラチン	●																												

身長: _____ cm 体重: _____ kg

体表面積 _____ m² (Mosteller RD式使用)

心電図モニター必要時あり

インラインフィルター付輸液セットは使用不可

[投与スケジュール] (_____ クール目)

DAY 1 (_____ 月 _____ 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
グラニセトン点滴静注用バッグ デキサート [30分 点滴静注]	1袋 9.9mg		
生食 50mL [30分]	1瓶		
生食50mL アブラキサン100mg/m ² (体表面積の計算:Mosteller R D式使用) [30分 点滴静注] [壊死性]		泡立てないように 1V20mLで懸濁 5mg/mL調製 空ボトルへ投与量を注入	
生食 50mL [全開 フラッシュ]	1瓶		

生食250mL カルボプラチンAUC6 [1時間 点滴静注] [炎症性] アレルギー症状注意 複数回以上 数分以内	1瓶
---	----

ブライミンク

生食 20mL [フラッシュ]	1瓶
--------------------	----

DAY 2(_____ 月 _____ 日) DAY 3(_____ 月 _____ 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

DAY 8(_____ 月 _____ 日) DAY 15(_____ 月 _____ 日)

薬剤名	投与量
生食50mL デキサート [30分 点滴静注]	1袋 6.6mg
生食 50mL [30分]	1瓶
生食50mL アブラキサン100mg/m ² (体表面積の計算:Mosteller R D式使用) [30分 点滴静注] [壊死性]	
生食 50mL [全開 フラッシュ]	1瓶

[DLF]

アブラキサン

骨髄抑制(好中球減少)

カルボプラチン

白血球及び血小板減少

カルボプラチン 腎障害時用量調節

泡立てないように
1V20mLで懸濁 5mg/mL調製
空ボトルへ投与量を注入

今回 累積

カルボプラチン	_____ mg	_____ mg
アブラキサン	_____ mg	_____ mg
アブラキサン	_____ mg	_____ mg
アブラキサン	_____ mg	_____ mg

[適正使用基準]

- 重篤な感染症がない
- 感染症またはその疑い(CRP異常、発熱、白血球増多)がない
- PS (Performance Status)が0~2である
- 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす

血液一般検査	Neut (/μL)	1500 ≤			
	PLT (/μL)	10万 ≤			
	HGB (g/dL)	9.0 ≤			
血清生化学検査	AST (IU/L)	正常値上限の2.5倍以下			
	ALT (IU/L)	正常値上限の2.5倍以下			
	TBil (mg/dL)	≤1.5			

Cr (mg/dL) ≤ 1.5			
心電図が正常である(心疾患・重篤な不整脈がない)			
末梢神経障害: ≤Grade 1 * (初回) ≤Grade 2 * (2回目以降)			

アブラキサン[®]の減量・再開基準の目安

	減量基準	再開基準	減量基準
好中球数	<500または<1500のため7日以上延期した場合	≥1500	次コース
血小板数	<50000	≥100000	次コース
発熱性好中球減少症	発現	回復	次コース
末梢神経障害	≥Grade 2	≤Grade 1	次回投与
皮膚障害	≥Grade 2	≤Grade 1	次回投与
粘膜炎または下痢	≥Grade 3	≤Grade 1	次回投与
非血液学的毒性 (脱毛を除く)	≥Grade 3	≥Grade 2	次回投与

減量の目安	アブラキサン	カルボプラチン
通常投与量	100mg/m ²	AUC6
1段階減量	75mg/m ²	AUC4.5
2段階減量	50mg/m ²	AUC3

[重大な副作用]

カルボプラチン

- ・汎血球減少等の骨髄抑制
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・間質性肺炎
- ・急性腎不全、ファンコニー症候群
- ・肝不全、肝機能障害、黄疸
- ・消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍
- ・出血性腸炎、偽膜性大腸炎
- ・麻痺性イレウス
- ・脳梗塞、肺梗塞
- ・血栓、塞栓症
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全
- ・溶血性尿毒症症候群
- ・急性呼吸窮迫症候群
- ・播種性血管内凝固症候群(DIC)
- ・急性膵炎
- ・難聴
- ・白質脳症

アブラキサン

- ・白血球減少等の骨髄抑制
- ・末梢神経障害
- ・脳神経麻痺、顔面神経麻痺
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・間質性肺炎、肺線維症
- ・急性呼吸窮迫症候群
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全、心伝導障害
- ・脳卒中、脳塞栓、肺水腫、血栓性静脈炎
- ・難聴、耳鳴
- ・消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍
- ・重篤な腸炎
- ・腸管閉塞、腸管麻痺
- ・肝機能障害、黄疸
- ・膵炎
- ・急性腎不全
- ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症
- ・播種性血管内凝固症候群(DIC)

