

[中吐]カルボプラチン+パクリタキセル放射線併用療法

外科 管理番号 RSF058

処方医:

適応症: 非小細胞肺癌、stage III

CBDCA/PTX: day1,8,15,22,29,36に投与する

放射線治療: 60Gy/30回(6週)、週に5回照射

化学放射線療法後にCBDCA+PTX療法を2サイクル行う

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン	●							●							●						
パクリタキセル	●							●							●						
放射線照射	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
カルボプラチン	●							●							●						
パクリタキセル	●							●							●						
放射線照射	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m²

[投与スケジュール]

Day1(月 日) Day8(月 日) Day15(月 日)

Day22(月 日) Day29(月 日) Day36(月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食250mL [3時間 点滴静注]	1瓶	ポラミン2mg	3錠(内服)
		グラニセロン点滴静注用バッグ3mg ファモチジン注20mg デキサート注	1袋 1管 9.9mg
		[30分 点滴静注]	
		生食 50mL [30分 点滴静注]	1瓶
		生食250mL パクリタキセル 40mg/m ² [1時間 点滴静注][壊死性] アレルギー症状注意 特に初~2回投与時 ほぼ10分 以内 投与中1時間観察	1袋
生食250mL カルボプラチン AUC2 [1時間 点滴静注][炎症性] アレルギー症状注意 複数回以上数分以内	1袋		
生食20mL [フラッシュ]		1管	プライミング

DAY2(月 日)~3(月 日) DAY9(月 日)~10(月 日)

DAY16(月 日)~17(月 日) DAY23(月 日)~24(月 日)

DAY30(月 日)~31(月 日) DAY37(月 日)~38(月 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

[今回の投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[累積投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[今回の投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[累積投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[今回の投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[累積投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[今回の投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[累積投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[今回の投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[累積投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[今回の投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[累積投与量]

パクリタキセル mg
カルボプラチン mg

[適正使用基準]

1. PS (Performance Status)が0～2である
2. 重篤な感染症を合併していない
3. 髄腔内投与でない
4. 機能障害を伴う重度の感覚異常又は知覚不全がない
5. ポリオキシエチレンヒマシ油含有製剤に対し過敏症の既往歴がない
6. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。

血液一般検査	WBC	(/μL)	4000 ≤						
	Neut	(/μL)	1600 ≤						
	PLT	(/μL)	15万 ≤						
	HGB	(g/dL)	11.0 ≤						
血清生化学検査	AST	(IU/L)	≤40						
	ALT	(IU/L)	≤35						
	TBil	(mg/dL)	≤1.2						
	BUN	(mg/dL)	≤20						
	Cr	(mg/dL)	≤1.1						

[DLF]

- パクリタキセル
白血球、好中球減少
カルボプラチン
白血球、血小板減少
カルボプラチン 腎障害時用量調節
パクリタキセル 肝障害時用量調節

[DLFを除く重大な副作用]

《パクリタキセル》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [呼吸困難・胸痛・低血圧・頻脈・徐脈・潮紅・血管浮腫・発汗等]
- ・間質性肺炎、肺繊維症 [発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常等]
- ・急性呼吸窮迫症候群 [呼吸困難・低酸素症・胸部X線異常等]
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全、心伝導障害、肺塞栓、血栓性静脈炎、脳卒中、肺水腫
[胸痛・むくみ・呼吸困難・チアノーゼ・意識障害等]

- ・難聴、耳鳴
- ・消化管壊死、腸管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍 [腹痛・嘔吐・吐血・下血等]
- ・重篤な腸炎 [激しい腹痛・下痢等]
- ・腸管閉塞、腸管麻痺 [食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等]
- ・肝機能障害、黄疸 [食欲不振・倦怠感・黄疸等]
- ・膵炎 [腹痛・腰背痛・血清アミラーゼ値上昇等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下・検査値異常等]
- ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症 [紅斑・発熱・関節痛・下痢等]
- ・播種性血管内凝固症候群 (DIC)

《カルボプラチン》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状
[チアノーゼ・呼吸困難・胸内苦悶・血圧低下等]
- ・脳梗塞 [頭痛・意識障害等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下・検査値異常等]
- ・麻痺性イレウス
[食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等]
- ・間質性肺炎 [発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常等]
- ・溶血性尿毒症症候群 [血尿・貧血・検査値異常等]
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全

