

[軽吐]テセントリク(アテゾリスマブ)療法(肺)

外科 識別番号:RSF047

処方医:

適応:非小細胞肺癌

3週毎に投与を繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
テセントリク	●																						●

身長: cm 体重: kg 体表面積 m²[投与スケジュール] (クール目)Day1 (月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食50mL 穿刺・プライミング用	1瓶	インラインフィルター使用(0.2又は0.22μm)	
		生食50mL プライミング用	1瓶
		生食250mL テセントリク [1時間 点滴静注](非炎症性) インフュージョンリアクション注意 特に初回~2回に注意	1瓶 1200mg
生食20mL [静注]	1管		

※忍容性良ければ2回目以降は30分で投与可

[適正使用基準]

1. 他の抗悪性腫瘍剤と併用でない。術後補助化学療法でない。			
2. PS(Performance Status)0~1が望ましい			
3. 妊婦又は妊娠している可能性がない			
4. 自己免疫性疾患の既往が無い又は家族歴が無い(慎重投与)			
5. 間質性肺炎がない又は既往がない(慎重投与)			
6. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす			
血液一般検査	WBC	≥3,000/mm ³	
	Neut	≥1,500/mm ³	
	PLT	≥100,000/mm ³	
	HGB	≥9.0g/dL	
血清生化学検査	GOT・GPT	施設基準値上限の3倍以下	
	TBIL	施設基準値上限1.5倍以下	
	クレアチニン	≤1.5mg/dL	
尿検査	蛋白、糖 etc...	施設正常値内	
	血糖値	随時血糖288mg/dL以下	
	TSH、FT-4	施設正常値内(月に1回検査)	

テセントリク投与患者登録 初回のみ

[重大な副作用]

《テセントリク》

- ・間質性肺疾患 [発熱・咳・呼吸困難等]
- ・重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症
- ・大腸炎、重度の下痢
- ・1型糖尿病
- ・免疫性血小板減少性紫斑病
- ・肝機能障害、肝炎
- ・甲状腺機能障害
- ・神経障害
- ・腎障害
- ・副腎障害
- ・脳炎
- ・重度の皮膚障害
- ・静脈血栓塞栓症

•infusion reaction