

イブランス+フェソロデックス療法(閉経後)(1コース目)

外科 管理番号 D23

処方医: []

適応: 乳癌

4週間を1クールとし投与を繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
フェソロデックス	●														●													
イブランス(内服)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

身長: [] cm 体重: [] kg 体表面積: [] m²

採血はサイクル1の投与前、day,8,15
サイクル2のday1,15
以降は各サイクルday1の4週毎

[投与スケジュール]

1クール目

Day1([] 月 [] 日)~Day21([] 月 [] 日)

薬剤名	投与量	用法
イブランス		1日1回 食後

Day1([] 月 [] 日)

薬剤名	投与量	用法
フェソロデックス筋注250mg	2筒	左右の臀部に1筒ずつ筋注 (1~2分かけて)

Day15([] 月 [] 日)

薬剤名	投与量	用法
フェソロデックス筋注250mg	2筒	左右の臀部に1筒ずつ筋注 (1~2分かけて)

[適正使用基準]

1. 妊娠又は妊娠している可能性がない
2. 授乳中の婦人ではない
3. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴がない

[重大な副作用]

- 肝機能障害
- 血栓塞栓症
- 肝機能障害、黄・下垂体卒中
- 骨髄抑制(イブランス)
- 間質性肺炎〔咳・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- アナフィラキシー様症状〔血圧低下・呼吸困難・喘鳴・蕁麻疹・不快感等〕
- 糖尿病の発症または増悪

<イブランス減量基準>

通常量	125mg/日
1段階減量	100mg/日
2段階減量	75mg/日

<好中球減少症および血小板減少に対する用量調節>

Grade1又は2	同一投与量を継続
Grade3	休薬。1週間以内にGrade2に回復後、同一投与量で投与再開する。 回復まで1週間以上や次サイクルでGrade3の好中球減少が再発する場合は減量を考慮
Grade3(好中球減少に38.5℃以上の発熱、感染がある場合)	Grade2以下に回復するまで休薬後、1段階減量して再開
Grade4	Grade2以下に回復するまで休薬後、1段階減量して再開

<非血液毒性の副作用>

Grade1又は2	同一投与量を継続
Grade3以上	治療しても症状が継続する場合、Grade1以下またはGrade2で安全性に問題がない状態に回復するまで休薬。 回復後1段階減量し投与再開する。