

[中吐]ドセタキセル+エンドキサン療法

外科 管理番号 D7
処方医:
適応症:乳癌
21日を1コースとする
4コース繰り返す

Table with 22 columns (days) and 2 rows (ドセタキセル, エンドキサン) showing treatment schedule with filled circles.

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m²

[投与スケジュール] (_____ クール目)

DAY1(月 日)

Main treatment table with columns for 本管 (Main Tube) and 側管 (Side Tube), listing drug names and dosages.

ブライミン[®]

DAY1昼(月 日)~DAY3朝(月 日)

Table for Decadron (デカドロン錠) with columns for drug name, dosage (8mg), and timing (2x morning after meals).

エンドキサン 腎障害時用量調節
ドセタキセル: 肝障害時用量調節
[DLF]
ドセタキセル: 好中球減少
エンドキサン 骨髄抑制および出血性膀胱炎

[適正使用基準]

- 1. PS (Performance Status)が0~2である
2. 重篤な感染症を合併していない
3. 髄腔内投与でない
4. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。
5. 機能障害を伴う重度の感覚異常又は知覚不全がない
6. PS (Performance Status)が0~2である
7. 出血性膀胱炎がない
8. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。

ドセタキセル (今回の投与量) (累積投与量)
_____ mg _____ mg
エンドキサン (今回の投与量) (累積投与量)
_____ mg _____ mg

[DLFを除く重大な副作用]

《エンドキサン》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [血圧低下・呼吸困難・喘鳴・蕁麻疹・不快感等]
・イレウス、胃腸出血 [腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等]
・間質性肺炎、肺繊維症 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
・心筋障害、心不全 [胸痛・呼吸困難・むくみ等]
・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症 [紅斑・発熱・関節痛・下痢等]
・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH) [むくみ・痙攣・意識障害等]

《ドセタキセル》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [呼吸困難・気管支痙攣・血圧低下・胸部圧迫感・発疹等]
・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
・心不全 [呼吸困難・むくみ等]
・播種性血管内凝固症候群 (DIC)
・腸管穿孔、胃腸出血 [腹痛・吐血・下血等]
・浮腫・体液貯留
・心筋梗塞 [胸痛・呼吸困難等]