

# トラスツズマブ(毎週)療法

外科: 管理番号 D12

処方医: 適応: 乳癌(術前・術後・進行・再発)

身長:  cm  
体重:  kg  
体表面積:  m<sup>2</sup>

投与	投与	投与	投与	投与
DAY1	DAY8	DAY15	DAY22	DAY29

術前・術後補助化学療法は以後1週間毎に1年間投与を  
定期的心機能評価

[投与スケジュール] (  1クール目)

DAY 1 (  月  日)

薬剤名	投与量	
カロナール2錠投与 (初回、2回目)		
生食250mL	1瓶	90分
トラスツズマブ4mg/kg		
生食20mL	1管	静注

## トラスツズマブ

### Loading Dose

インフュージョンリアクション注意

特に初~2回に注意

特に投与後1時間まで観察

(非炎症性)

[投与スケジュール] (  2クール目)

DAY 8 (  月  日)

薬剤名	投与量	
カロナール2錠投与 (初回、2回目)		
生食250mL	1瓶	90分
トラスツズマブ2mg/kg		
生食20mL	1管	静注

インフュージョンリアクション注意

特に初~2回に注意

特に投与後1時間まで観察

(非炎症性)

\* 忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる

[投与スケジュール]

(  3クール目) (  4クール目) (  5クール目)  
DAY (  月  日) DAY (  月  日) DAY (  月  日)

(  6クール目) (  7クール目) (  8クール目)  
DAY (  月  日) DAY (  月  日) DAY (  月  日)

(  9クール目) (  10クール目) (  11クール目)  
DAY (  月  日) DAY (  月  日) DAY (  月  日)

(  12クール目) (  13クール目) (  14クール目)  
DAY (  月  日) DAY (  月  日) DAY (  月  日)

薬剤名	投与量	
生食250mL	1瓶	90分*
トラスツズマブ2mg/kg		
生食20mL	1管	静注

インフュージョンリアクション注意

特に初~2回に注意

特に投与後1時間まで観察

(非炎症性)

\* 忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる

[適正使用基準]

1. PS (Performance Status)が0~2である		
*2. 重篤な感染症を合併していない		
3. 髄腔内投与でない		
4. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。		
血液一般検査	*WBC (/μL)	4000 ≤
	*Neut (/μL)	1600 ≤
	*PLT (/μL)	15万 ≤
	*HGB (g/dL)	11.0 ≤
血清生化学検査	GOT (IU/L)	≤40
	GPT (IU/L)	≤35
	TBil (mg/dL)	≤1.2
	Cr (mg/dL)	≤1.1
	BUN (mg/dL)	≤20

《トラスツズマブ》・Infusion reaction: アナフィラキシー様症状、肺障害 [チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下・浮腫等]

・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]

・白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血 [出血(紫斑)・立ちくらみ・発熱等]

・肝不全、黄疸、肝炎、肝障害 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]

・腎障害 [むくみ・尿量低下・検査値異常等]

・昏睡、脳血管障害、脳浮腫 [意識障害等]

・敗血症 [発熱・皮下出血等]

ε)

繰り返す