

# トラスツズマブ(3週毎)療法

外科: 管理番号 D11

処方医: 適応: 乳癌(術前・術後・進行再発)

身長: \_\_\_\_\_ cm  
体重: \_\_\_\_\_ kg  
体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

投与	投与	投与	投与	投与	投与	投与
DAY1	DAY22	DAY43	DAY64	DAY85	DAY106	DAY127
DAY148	DAY169	DAY190	DAY211	DAY232	DAY253	DAY274
DAY295	DAY316	DAY337	DAY358	DAY379		

術前・術後補助化学療法は21日ごとに約1年

## トラスツズマブ Loading Dose

[投与スケジュール] ( \_\_\_\_\_ 1クール目)

DAY 1 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

薬剤名	投与量	
カロナル2錠投与 (初回、2回目)		
生食250mL	1瓶	
注射用水20mL **	1A	90分
トラスツズマブ8mg/kg		
生食20mL	1管	静注

**定期的心機能評価**  
 インフュージョンリアクション注意  
 特に初～2回に注意  
 特に投与後1時間まで観察  
 (非炎症性)

DAY 22 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) (2クール目)

薬剤名	投与量	
カロナル2錠投与 (初回、2回目)		
生食250mL	1瓶	
注射用水20mL **	1A	90分
トラスツズマブ6mg/kg		
生食20mL	1管	静注

**定期的心機能評価**  
 インフュージョンリアクション注意  
 特に初～2回に注意  
 特に投与後1時間まで観察  
 (非炎症性)

\* 忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる

\*\* トラスツズマブ溶解液量 60mg: 1バイアル3mLで溶解 150mg: 1バイアル7.2mLで溶解  
↓ 3クール目以降

( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目)  
DAY 43 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY 64 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY 85 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目)  
DAY106 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY127 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY148 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目)  
DAY169 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY190 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY211 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目)  
DAY232 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY253 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY274 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目)  
DAY295 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY316 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY337 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

( \_\_\_\_\_ クール目) ( \_\_\_\_\_ クール目)  
DAY358 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY379 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

薬剤名	投与量	
生食250mL	1瓶	
注射用水20mL **	1A	90分*
トラスツズマブ6mg/kg		
生食20mL	1管	静注

**インフュージョンリアクション注意**  
 特に初～2回に注意  
 特に投与後1時間まで観察

\* 忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる (非炎症性)

\*\* トラスツズマブ溶解液量 60mg: 1バイアル3mLで溶解 150mg: 1バイアル7.2mLで溶解

《トラスツズマブ》・Infusion reaction: アナフィラキシー様症状、肺障害 [チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下・浮腫等]

・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]

・白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血 [出血(紫斑)・立ちくらみ・発熱等]

・肝不全、黄疸、肝炎、肝障害 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]

・腎障害 [むくみ・尿量低下・検査値異常等]

・昏睡、脳血管障害、脳浮腫 [意識障害等]

・敗血症 [発熱・皮下出血等]

