

カペシタビン減量時の投与量: 1回用量

体表面積	減量段階1	減量段階2
1. 13m ² 未満	900mg	600mg
1. 13m ² 以上1. 21m ² 未満	1200mg	
1. 21m ² 以上1. 45m ² 未満		900mg
1. 45m ² 以上1. 69m ² 未満	1500mg	1200mg
1. 69m ² 以上1. 77m ² 未満		
1. 77m ² 以上	1800mg	

[DLFを除く重大な副作用]

ハーセプチン

- ・Infusion reaction: アナフィラキシー様症状、肺障害 [チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下・浮腫等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血 [出血(紫斑)・立ちくらみ・発熱等]
- ・肝不全、黄疸、肝炎、肝障害 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・腎障害 [むくみ・尿量低下・検査値異常等]
- ・昏睡、脳血管障害、脳浮腫 [意識障害等]
- ・敗血症 [発熱・皮下出血等]

カペシタビン

- ・脱水症状
- ・手足症候群
- ・心障害
- ・肝障害、黄疸
- ・腎障害
- ・骨髄抑制
- ・口内炎
- ・間質性肺炎