

パクリタキセル+アバスチン(ヘパシズマブ)療法

外科 管理番号 D435

処方医:

適応:乳癌

4週毎に繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
パクリタキセル	●							●							●														
アバスチン	●														●														

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m² **心電図モニター必要時あり**

[投与スケジュール] (_____ クール目)

DAY 1 (_____ 月 _____ 日) DAY 15 (_____ 月 _____ 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食250mL [3.5時間 点滴静注]	1瓶	生食100mL	1瓶
		アバスチン 10mg/kg [投与時間注意*] [非炎症性] インフュージョンリアクション注意	
		【内服】ポララミン錠2mg	3錠
		生食 50mL	1袋
		ファモチジン注20mg	1管
		デキサート **	8. 25mg
		【30分 点滴静注】	
生食 50mL	1瓶		
生食250mL	1瓶		
パクリタキセル90mg/m ² [1時間 点滴静注] [壊死性] アレルギー症状注意 特に初~2 回投与時 ほぼ10分以内投与中 1時間観察			
生食20mL	1管		
【フラッシュ】			

- * 初回投与時は90分 初回の認容性が良好であれば2回目の投与は60分間で行ってもよい。
- 2回目の投与においても認容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与することができる
- ** デキサートは、過敏症等なければ2回目4. 95mg、3回目以降1. 65mgまで減量可能

DAY 8 (_____ 月 _____ 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食250mL [2時間 点滴静注]		【内服】ポララミン錠2mg	3錠
		生食 50mL	1袋
		ファモチジン注20mg	1管
		デキサート **	8. 25mg
		【30分 点滴静注】	
		生食 50mL	1瓶
		【30分 点滴静注】	
生食250mL	1瓶		
パクリタキセル90mg/m ² [1時間 点滴静注] [壊死性] アレルギー症状注意 特に初~2 回投与時 ほぼ10分以内投与中 1時間観察			
生食20mL	1管		
【フラッシュ】			

- * 初回投与時は90分 初回の認容性が良好であれば2回目の投与は60分間で行ってもよい。
- 2回目の投与においても認容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与することができる
- ** デキサートは、過敏症等なければ2回目4. 95mg、3回目以降1. 65mgまで減量可能

[骨髓抑制を考慮した投与量の調節]

パクリタキセル WBC4000未満・Neut2000未満で投与中止

前回投与後にWBC1000以下または重篤な末梢神経障害(GradeⅢ以上)を起こしたとき

[今回の投与量]		[累積投与量]	
アバステン:	mg	アバステン:	mg
パクリタキセル:	mg	パクリタキセル:	mg
[今回の投与量]		[累積投与量]	
パクリタキセル:	mg	パクリタキセル:	mg
[今回の投与量]		[累積投与量]	
アバステン:	mg	アバステン:	mg
パクリタキセル:	mg	パクリタキセル:	mg

[DLF] パクリタキセル:
白血球・好中球
および末梢神経障害
肝障害時用量調節

パクリ

[適正使用基準]

1. PS (Performance Status)が0～2である			
2. 肺出血・喀血(2.5mL以上の鮮血の喀血)の既往がない			
3. 脳転移がない			
4. 重篤な骨髄抑制がない			
5. 感染症を合併していない			
6. ポリオキシエチレンヒマシ油含有製剤に対し過敏症の既往歴がない			
7. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす			
WBC	4000 ≤		
Neut	2000 ≤		
PLT	15万 ≤		
HGB	9.0 ≤		
GOT	正常値上限の2倍以下		
GPT	正常値上限の2倍以下		
TBIL	≤1.5		
BUN	≤25		
Cr	≤1.5		
Mg	1.7～2.5		
K	3.5～5.0		
Na	135～146		
Ca	8.7～11		
P	2.5～4.7		
蛋白尿	2+～4+:1+に回復するまで休薬		

[重大な副作用]

《アバステン》

- ・消化管穿孔(突然起こる強い腹痛)
- ・創傷治癒遅延
- ・原発巣からの出血(下血)
- ・肺転移巣からの出血(喀血)
- ・脳転移巣からの出血(突発性の意識障害、神経障害、頭痛、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・動脈血栓(胸痛)
- ・動脈血栓(突発性の意識障害、神経症状、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・高血圧に伴う緊(頭痛、視力障害、意識障害、悪心・嘔吐)
- ・可逆性後白室脳症症候群
- ・ネフローゼ症候群(蛋白尿)
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・好中球減少症
- ・うっ血性心不全(呼吸困難、乏尿、体重の変化)

《パクリタキセル》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・間質性肺炎、肺繊維症
- ・急性呼吸窮迫症候群【呼吸困難・低酸素症・胸部X線異常等】
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全、心伝導障害、肺塞栓、血栓性静脈炎、脳卒中、肺水腫
- ・難聴、耳鳴
- ・消化管壊死、腸管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍【腹痛・嘔吐・吐血・下血等】
- ・重篤な腸炎【激しい腹痛・下痢等】
- ・腸管閉塞、腸管麻痺【食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等】
- ・肝機能障害、黄疸【食欲不振・倦怠感・黄疸等】
- ・膵炎【腹痛・腰部痛・血清アミラーゼ値上昇等】
- ・急性腎不全【むくみ・尿量低下・検査値異常等】
- ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症【紅斑・発熱・関節痛・下痢等】

・播種性血管内凝固症候群(DIC)