

## [軽吐]sLV5FU2+アバスチン(ベバシズマブ)療法

外科 管理番号 D213

処方医:

適応症:大腸癌

2週間を1クールとして投与を繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン	●													
レボホリナート	●													
フルオウラシル(ホーラス)	●													
フルオウラシル(持続)	●	●	●											

身長: \_\_\_\_\_ cm 体重: \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

[投与スケジュール] ( \_\_\_\_\_ クール目)

Day1( 月 日 ~ 月 日)

本管	
薬剤名	投与量
生食20mL 10mL以上のシリンジ使用 ポート開通確認	10mL
生食100mL アバスチン 5mg/kg [投与時間注意*] インフュージョンリアクション注意	
生食50mL デキサート [30分 点滴静注]	1瓶 6.6mg
生食500mL レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup> [2時間 点滴静注]	1瓶
生食50mL フルオウラシル注 400mg/m <sup>2</sup> [15分間][炎症性]	1瓶
生食250mL フルオウラシル注2400mg/m <sup>2</sup> [46時間 5mL/H][炎症性]	フルオウラシルと生食適量を 混合し230mLとする
生食20mL 10mL以上のシリンジ使用 ポートフラッシュ	10mL

\* 初回投与時は90分 初回の認容性が良好であれば2回目の投与は60分間で行ってもよい。  
2回目の投与においても認容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与することができる

[DLF] フルオウラシル 白血球減少・口内炎および下痢  
イリノテカン 白血球及び下痢(水様便)

## [適正使用基準]

1. 口内炎がない			
2. 下痢がない			
3. TS-1が投与されていないかまたは投与中止後7日以上経っている			
4. 重症感染症またはその疑いがない			
5. 腸管麻痺・腸閉塞がない			
6. 間質性肺炎または肺線維症がない			
7. 多量の腹水・胸水がない			
8. 黄疸がない			
9. 硫酸アタザナビルを投与されていない			
10. PS(Performance Status)が0~2である			
11. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。			
血液検査	WBC	4000 ≤	
一般	Neut	1600 ≤	
	PLT	15万 ≤	

HGB	11.0 ≤	
GOT	≤40	
GPT	≤35	
TBil	≤1.2	
BUN	≤20	
Cr	≤1.1	
Mg	1.7~2.5	
K	3.5~5.0	
Na	135~146	
Ca	8.7~11	
P	2.5~4.7	
蛋白尿	2+まで投与可	

[肝機能を考慮した投与量の調節]

TBil(mg/dL)	<5.0	5.0 ≤
フルオロウラシル	100%	中止

[DLF以外の重大な副作用]

フルオロウラシル

- ・脱水症状 [激しい下痢等]
- ・出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎 [激しい腹痛・下痢等]
- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等]
- ・白質脳症 [歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等]
- ・うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症 [疲労感・息苦しさ・むくみ・胸痛・胸部圧迫感等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・肝機能障害・黄疸、肝不全 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・消化管潰瘍 [食欲不振・腹痛・吐血・下血等]
- ・急性膵炎 [腹痛・腰背痛・発熱・嘔吐・血清アミラーゼ値上昇等]
- ・意識障害を伴う高アンモニア血症
- ・肝・胆道障害(胆嚢炎、胆管壊死、肝実質障害等) \* 肝動脈内投与時 [腹痛・発熱・黄疸等]
- ・手足症候群 [手掌・足趾の紅斑・疼痛性発赤腫脹・知覚過敏等]
- ・臭覚障害、嗅覚脱失(長期投与症例に多い)

アハスチン

- ・消化管穿孔(突然起こる強い腹痛)
- ・創傷治癒遅延
- ・原発巣からの出血(下血)
- ・肺転移巣からの出血(喀血)
- ・脳転移巣からの出血(突発性の意識障害、神経障害、頭痛、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・動脈血栓塞栓症 (胸痛)
- ・動脈血栓(突発性の意識障害、神経症状、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・高血圧に伴う緊(頭痛、視力障害、意識障害、悪心・嘔吐)
- ・可逆性後白室脳症症候群
- ・ネフローゼ症候群(蛋白尿)
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・好中球減少症
- ・うっ血性心不全(呼吸困難、乏尿、体重の変化)