

[中吐]SOX+アバスチン(ヘパシマブ)(大腸)療法

外科: 管理番号 RSC047
処方医:
適応症: 大腸癌
3週間を1コースとして投与を繰り返す

Calendar grid showing treatment days (1-22) for Abastin, Oxaliplatin, and S-1 (Morning/Evening).

身長: cm 体重: kg 体表面積 m^2

[投与スケジュール] ( コース)

Day1( 月 日)

Main treatment schedule table with columns for Main Tube (本管) and Side Tube (側管), listing drug names and dosages.

※アバスチン投与時間: 初回90分 2回目:60分 3回目以降30分
初回投与時は90分、初回の認容性が良好であれば2回目の投与は60分で行ってもよい。
2回目の投与においても認容性が良好であれば、それ以降の投与は30分で投与することができる。

DAY2( 月 日)~3( 月 日)

Table for Day 2-3 treatment: Dexamethasone 8mg, 1x after breakfast.

Day1夕食後( 月 日)~Day15朝食後( 月 日)

Table for Day 1 evening to Day 15 morning treatment: S-1, 2x after breakfast.

[投与前・適正使用基準]

- 1. 脳転移がない
2. フツ化ピリミジン中止後7日以内の患者ではない
3. 重篤な腎障害がない
4. PSが0~1である

S-1 腎障害時用量調節 [DLF]
S-1 骨髄抑制
オキサリプラチン 末梢神経障害

4. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。		
WBC	(/μL)	3000 ≤
Neut	(/μL)	1500 ≤
PLT	(/μL)	7.5万 ≤
TBIL	(mg/dL)	<2
AST	(IU/L)	≤100
ALT	(IU/L)	≤100
Cr*	(mg/dL)	<1.5
Mg		1.7~2.5
K		3.5~5.0
Na		135~146
Ca		8.7~11
P		2.5~4.7
蛋白尿		2+まで投与可

\* 肝転移を有する場合はAST165、ALT210以下

S1休薬基準	S1				
	オキサリプラチン	1.25未満	1.25~1.5	m <sup>2</sup> 1.5以上	
好中球数 1000未満	初回基準量	130mg/m <sup>2</sup>	80mg/日	100mg/日	120mg/日
PLT 75000未満	1段階減量用量	100mg/m <sup>2</sup>	60mg/日	80mg/日	100mg/日
Cr 1.5以上	2段階減量用量	75mg/m <sup>2</sup>	50mg/日	60mg/日	80mg/日
感染伴う38度以上の発熱					
下痢 Grade2以上					
口内炎 Grade2以上					

#### [重大な副作用]

##### オキサリプラチン

- ・末梢神経障害
- ・ショック、アナフィラキシー症状 〔発疹・そう痒・気管支痙攣・呼吸困難・血圧低下等〕
- ・間質性肺炎、肺繊維症 〔発熱・咳・呼吸困難等〕
- ・骨髄機能抑制 〔検査値異常等チェック〕
- ・溶血性尿毒症症候群
- ・視野欠損、視野障害、視神経炎、視力低下
- ・血栓塞栓症
- ・心室性不整脈、心筋梗塞 〔脈のみだれ・息苦しさ・心電図異常・胸痛〕
- ・肝静脈閉塞症

##### アバスタチン

- ・消化管穿孔(突然起こる強い腹痛)
- ・創傷治癒遅延
- ・原発巣からの出血(下血)
- ・肺転移巣からの出血(喀血)
- ・脳転移巣からの出血(突発性の意識障害、神経障害、頭痛、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・動脈血栓(胸痛)
- ・動脈血栓(突発性の意識障害、神経症状、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・高血圧に伴う緊(頭痛、視力障害、意識障害、悪心・嘔吐)
- ・可逆性後白室脳症症候群
- ・ネフローゼ症候群(蛋白尿)
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・好中球減少症
- ・うっ血性心不全(呼吸困難、乏尿、体重の変化)

##### ティーエスワン

- ・脱水症状 〔激しい下痢等〕
- ・重篤な腸炎 〔激しい腹痛・下痢等〕
- ・間質性肺炎 〔咳嗽・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- ・重篤な口内炎、消化管潰瘍、消化管出血、消化管穿孔 〔腹痛・嘔吐・吐血・下血等〕
- ・急性腎不全 〔むくみ・乏尿等〕
- ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症 〔紅斑・発熱・関節痛・下痢等〕
- ・白質脳症 〔歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等〕
- ・臭覚脱失