

[中吐] FOLFIRI療法

外科 管理番号 C30

処方医:

適応症: 大腸癌

2週間を1クールとして投与を繰り返す

Table with 14 columns (days) and 4 rows (Levofolinate, Irinotecan, Fluorouracil (bolus), Fluorouracil (continuous)).

身長: cm 体重: kg 体表面積 m²

[投与スケジュール] (クール目)

Day1 (月 日 ~ 月 日)

Main treatment schedule table with columns for '本管' (Main Line) and '側管' (Side Line), listing drug names and dosages.

プライミング

DAY2 (月 日) ~ 3 (月 日)

Table for Day 2 treatment: Dexamethasone 8mg, 1x after breakfast.

[適正使用基準]

Table of clinical criteria for treatment, including items like oral inflammation, diarrhea, and lab values (WBC, Neut, PLT, HGB, GOT, GPT, TBil).

[DLF] フルオウラシル:

白血球減少・口内炎および下痢

[DLF] イリノテカン

白血球及び下痢(水様便)

イリノテカンの投与量

[今回の投与量] [累積投与量]

mg/body m

BUN	(mg/dL)	≤ 20	
Cr	(mg/dL)	≤ 1.1	

[肝機能を考慮した投与量の調節]

TBil(mg/dL)	<5.0	5.0≤
フルオウラシル	100%	中止

[FOLFIRI療法における減量基準]

		フルオウラシル	イリノテカン
G2以上	好中球減少	—	180mg/m ² →150mg/m ²
G2以上	血小板減少		
G2以上	下痢		
G3以上	すべての毒性	2400mg/m ² →2000mg/m ²	—

[DLF以外の重大な副作用]

フルオウラシル

- ・脱水症状 [激しい下痢等]
- ・出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎 [激しい腹痛・下痢等]
- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等]
- ・白質脳症 [歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等]
- ・うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症 [疲労感・息苦しさ・むくみ・胸痛・胸部圧迫感等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・肝機能障害・黄疸、肝不全 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・消化管潰瘍 [食欲不振・腹痛・吐血・下血等]
- ・急性膵炎 [腹痛・腰背痛・発熱・嘔吐・血清アミラーゼ値上昇等]
- ・意識障害を伴う高アンモニア血症
- ・肝・胆道障害(胆嚢炎、胆管壊死、肝実質障害等) * 肝動脈内投与時 [腹痛・発熱・黄疸等]
- ・手足症候群 [手掌・足趾の紅斑・疼痛性発赤腫脹・知覚過敏等]
- ・臭覚障害、嗅覚脱失(長期投与症例に多い)

イリノテカン

- ・腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞 [腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [呼吸困難・血圧低下等]
- ・肝機能障害、黄疸 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]
- ・肺塞栓症、静脈血栓症 [呼吸困難・チアノーゼ等]
- ・心筋梗塞、狭心症発作 [胸痛・呼吸困難等]
- ・心室性期外収縮 [脈の乱れ・心電図異常等]

