

[中吐]FOLFIRI+ベクティビックス(パニツムマブ)療法

外科 管理番号 D234
処方医:
適応症: 大腸癌
2週間を1クールとして投与を繰り返す

Table with 15 columns (days 1-14) and 5 rows (Bektybix, Leovorin, Irinotecan, FOLFIRI bolus, FOLFIRI continuous).

身長: [] cm 体重: [] kg 体表面積 [] m²

[投与スケジュール] ([] クール目)

Day1([] 月 [] 日 ~ [] 月 [] 日)

インラインフィルター(0.2または0.22ミクロンを使用すること)

Table with 4 columns: Main tube (Medicine name, Dose), Side tube (Medicine name, Dose).

Table with 4 columns: Main tube (Medicine name, Dose), Side tube (Medicine name, Dose).

Table with 4 columns: Main tube (Medicine name, Dose), Side tube (Medicine name, Dose).

Table with 4 columns: Main tube (Medicine name, Dose), Side tube (Medicine name, Dose).

Table with 4 columns: Main tube (Medicine name, Dose), Side tube (Medicine name, Dose).

Table with 4 columns: Main tube (Medicine name, Dose), Side tube (Medicine name, Dose).

Table with 4 columns: Main tube (Medicine name, Dose), Side tube (Medicine name, Dose).

Day2([] 月 [] 日) ~ Day3([] 月 [] 日)

Table with 4 columns: Medicine name, Dose, Frequency.

[適正使用基準]

Table with 10 rows listing clinical criteria for drug use.

irinotecan dose [] mg/body, cumulative dose [] mg/body

11. 硫酸アタザナビルを投与されていない		
12. PS (Performance Status)が0~1である		
13. 適切なインフォームド・コンセントに基づき患者から文書により同意が得られている		
14. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。		
WBC	4000 ≤	<12000
Neut	1600 ≤	
PLT	10万 ≤	
GOT	≤100	
GPT	≤100	
TBil	≤2	
BUN	≤20	
Cr	≤1.1	
Mg	1.7~2.5	
K	3.5~5.0	
Na	135~146	
Ca	8.7~11	
P	2.5~4.7	

[肝機能を考慮した投与量の調節]

TBil(mg/dL)	<5.0	5.0 ≤
フルオロウラシル	100%	中止

[DLF] フルオロウラシル: 白血球減少・口内炎および下痢
 イリノテカン: 白血球及び下痢(水様便)

[FOLFIRI療法における減量基準]

		フルオロウラシル	イリノテカン
G2以上	好中球減少	-	180mg/m ² →150mg/m ²
G2以上	血小板減少		
G2以上	下痢		
G3以上	すべての毒性	2400mg/m ² →2000mg/m ²	-

[ベクティビックス減量基準]<grade3以上の皮膚障害発現時の容量調節の目安>

皮膚障害発現時のベクティビックスの投与量	ベクティビックスの投与	投与延期後の状態	ベクティビックスの用量調節
6mg/kg	投与延期	6週間以内にgrade2以下に回復	6mg/kg 又は4.8mg/kg
4.8mg/kg	投与延期	6週間以内にgrade2以下に回復	3.6mg/kg
3.6mg/kg	投与中止		

[DLF以外の重大な副作用]

フルオロウラシル

- ・脱水症状〔激しい下痢等〕
- ・出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎〔激しい腹痛・下痢等〕
- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等〕
- ・白質脳症〔歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等〕
- ・うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症〔疲労感・息苦しさ・むくみ・胸痛・胸部圧迫感等〕
- ・急性腎不全〔むくみ・尿量低下等〕
- ・間質性肺炎〔咳・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- ・肝機能障害・黄疸、肝不全〔食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等〕
- ・消化管潰瘍〔食欲不振・腹痛・吐血・下血等〕
- ・急性膵炎〔腹痛・腰背痛・発熱・嘔吐・血清アミラーゼ値上昇等〕
- ・意識障害を伴う高アンモニア血症
- ・肝・胆道障害(胆嚢炎、胆管壊死、肝実質障害等) * 肝動脈内投与時〔腹痛・発熱・黄疸等〕
- ・手足症候群〔手掌・足趾の紅斑・疼痛性発赤腫脹・知覚過敏等〕
- ・臭覚障害、嗅覚脱失(長期投与症例に多い)

イリノテカン

- ・腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞〔腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等〕
- ・間質性肺炎〔咳・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔呼吸困難・血圧低下等〕
- ・肝機能障害、黄疸〔食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等〕
- ・急性腎不全〔むくみ・尿量低下等〕
- ・肺塞栓症、静脈血栓症〔呼吸困難・チアノーゼ等〕
- ・心筋梗塞、狭心症発作〔胸痛・呼吸困難等〕

ベクティビックス

- ・重度の皮膚障害
- ・間質性肺疾患(間質性肺炎、肺線維症、肺臓炎、肺浸潤)
- ・インフュージョン リアクション
- ・下痢

・心室性期外収縮【脈の乱れ・心電図異常等】