

(処方チェックシート)

[中吐]CAPIRI療法

外科：管理番号 RSC051

処方医：

適応症：大腸癌

3週間を1コースとして投与を繰り返す

Calendar grid for days 1-22 with medication markers for Irinotecan, Capecitabine AM, and Capecitabine PM.

身長: cm 体重: kg 体表面積 m²

[投与スケジュール] (コース)

Day1(月日)

Medication schedule table for Day 1, detailing main and side tube treatments including food, irinotecan, and dexsorbitol.

DAY2(月日)~3(月日)

Medication schedule table for Day 2-3, including dexamethasone and irinotecan dosing.

Day1夕食後(月日)~Day15朝食後(月日)

Medication schedule table for Day 1 evening to Day 15 morning, including capecitabine dosing.

(用量注意！)

カペシタビン 腎障害時用量調節

[カペシタビンの投与量]

カペシタビンの1日あたりの用量は「800mg/m²/回1日2回」であり、カペシタビンが「治療切除不能な進行再発の結腸・直腸癌」の効能効果で承認を受けている1日あたりの用量「1000mg/m²/回1日2回」と異なります。

Table showing body surface area (BSA) ranges and corresponding starting and reduced doses for irinotecan (Level 1 and Level 2).

レベル-2は最低用量であり、これ以上の減量は推奨できない。

[カペシタビン:腎障害時の目安と対処法]

Table for capecitabine dosing adjustments based on creatinine clearance (Ccr).

[減量時のイリノテカンの投与量]

Table for irinotecan dosing adjustments based on levels during dose reduction.

レベル-2 (100mg/m²)

以下のUGT1A1遺伝子多型を有する場合

*6ホモ接合体、*28ホモ接合体、*6及び*28ダブルヘテロ接合体

●休薬減量基準

レベル-2を超える減量は投与中止

	Grade
好中球減少・血小板減少	3以上(初回)2以上(2回目以降)
2週間以上持続する、または2回目のGrade2の好中球減少または血小板減少	2
2週間以上持続する、または2回目のGrade3の好中球減少または口腔内粘膜炎	2
手足症候群	2
その他の非血液毒性	3以上(初回)2以上(2回目以降)
担当医が減量を必要を判断した場合	全て

●手足症候群の場合はカペシタビンのみ減量する

●複数の事由で減量レベルをダブルカウントしない

●一度減量した薬剤の増量は許容されない

●臨床上問題となる有害事象は担当医の判断でレベル-2まで減量可能

1. 重篤な骨髄抑制がない	[DLF]イリノテカン 白血球減少および下痢(水様便)	
2. 重篤な腎障害がない		
3. 重篤な肝障害がない		
4. 他のフッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、フルシトシンを投与していない		
5. 下痢がない		
6. 腸管麻痺、腸閉塞がない		[DLF] カペシタビン 手足症候群
7. 間質性肺炎、肺繊維症がない		
8. 多量の腹水、胸水がない		
9. 黄疸がない		
10. アタナビルを投与していない		
11. 脳転移がない		
12. PSが0~1である		
WBC	4000	
PLT	10万≦	
Hb	9	
TBIL	<1.5	
GOT	≦100	
GPT	≦100	
CCr	30以上	
初回はUGT1A1変異確認 *6ホモ接合体、*28ホモ接合体、*6及び*28ダブルヘテロ接合体はイリノテカン減量		

[重大な副作用]

カペシタビン

- ・脱水症状
- ・手足症候群
- ・心障害
- ・肝障害、黄疸
- ・腎障害
- ・骨髄抑制
- ・口内炎
- ・間質性肺炎

《イリノテカン》

- ・骨髄機能抑制
- ・高度な下痢
- ・腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞 [腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [呼吸困難・血圧低下等]
- ・肝機能障害、黄疸 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]