

[中吐]IRIS+アバスチン(ヘバスチマブ)(4週1コース)療法

外科: 管理番号 D228

処方医:

適応症: 大腸癌

4週間を1コースとして投与を繰り返す

Calendar grid showing treatment days for Abastin, Irinotecan, and TS-1 from Day 1 to Day 28.

身長: cm 体重: kg 体表面積 m²

[投与スケジュール] (コース)

Day1(月日) Day15(月日)

Medication schedule table with columns for drug name, dosage, and administration details.

10mL以上のシリンジ使用
初回:90分 2回:60分
3回目以降:30分
(非炎症性)
インフュージョンリアクション注意

(炎症)

10mL以上のシリンジ使用

\* 初回投与時は90分 初回の認容性が良好であれば2回目の投与は60分間でなくてもよい。
2回目の投与においても認容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与することができる

DAY2(月日)~3(月日) DAY16(月日)~17(月日)

Medication schedule table for Day 2-3 and Day 16-17.

Day1(月日)~Day14(月日)

Medication schedule table for Day 1-14.

体表面積 TS-1基準量

Table mapping body surface area (BSA) to TS-1 dosage.

[投与前・適正使用基準]

- 1. 重篤な骨髄抑制がない
2. 重篤な腎障害がない
3. 重篤な肝障害がない
4. 他のフッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、フルシトシンを投与していない
5. 下痢がない
6. 腸管麻痺、腸閉塞がない
7. 間質性肺炎、肺繊維症がない
8. 多量の腹水、胸水がない
9. 黄疸がない
10. アタナビルを投与していない
11. 脳転移がない
12. PSが0~1である

[DLF]イリノテカン

白血球減少および下痢(水様便)

[DLF] TS-1

白血球減少及び下痢(水様便)

Table of laboratory test results including WBC, PLT, Hb, TBIL, GOT, GPT, CCr, Mg, K, Na, and Ca.

P	2. 5~4. 7	
蛋白尿	2+で投与可	

[重大な副作用]

《アバスタチン》

- ・消化管穿孔(突然起こる強い腹痛)
- ・創傷治癒遅延
- ・原発巣からの出血(下血)
- ・肺転移巣からの出血(咯血)
- ・脳転移巣からの出血(突発性の意識障害、神経障害、頭痛、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・動脈血栓(胸痛)
- ・動脈血栓(突発性の意識障害、神経症状、嘔気・嘔吐、めまい)
- ・高血圧に伴う緊(頭痛、視力障害、意識障害、悪心・嘔吐)
- ・可逆性後白室脳症症候群
- ・ネフローゼ症候群(蛋白尿)
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・好中球減少症
- ・うっ血性心不全(呼吸困難、乏尿、体重の変化)

《ティーエスワン》

- ・骨髄抑制、溶血性貧血：汎血球減少、無顆粒球症、白血球減少、貧血、血小板減少等の重篤な骨髄抑制、溶血性貧血
- ・DIC
- ・劇症肝炎等の重篤な肝障害
- ・脱水症状 [激しい下痢等]
- ・重篤な腸炎 [激しい腹痛・下痢等]
- ・間質性肺炎 [咳嗽・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・重篤な口内炎、消化管潰瘍、消化管出血、消化管穿孔 [腹痛・嘔吐・吐血・下血等]
- ・急性腎不全 [むくみ・乏尿等]
- ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症
- ・白質脳症等を含む精神神経障害 [歩行時のふらつき・]
- ・急性膵炎
- ・横紋筋融解症
- ・臭覚脱失

《イリノテカン》

- ・骨髄機能抑制
- ・高度な下痢
- ・腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞 [腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [呼吸困難・血圧低下等]
- ・肝機能障害、黄疸 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]