

(2コース目～)イリノテカン(2週間隔)+アービタックス(セツキシマブ)療法

外科: 管理番号 D225

	2クール							次クール
	D1	D8	D15	D22	D29	D36	D43	D50
アービタックス	250mg/m ²	250mg/m ²	250mg/m ²	250mg/m ²	250mg/m ²	250mg/m ²	250mg/m ²	250mg/m ²
イリノテカン	150mg/m ²		150mg/m ²	-	150mg/m ²	-	-	150mg/m ²

処方医: 7週を1クールとして投与を繰り返す

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積: _____ m²

[投与スケジュール] (_____ クール目)

DAY1 (月 日) DAY15 (月 日) DAY29 (月 日)

薬剤名	投与量	
生食100mL デキサート注	1瓶 6.6mg	30分
ポララミン	3錠内服	
生食100mL	1瓶	30分
生食250mL アービタックス250mg/m ² 【アービタックス1瓶(20mL)中 100mg】	1瓶	1時間
生食100mL	1瓶	30分
グラニセトロン点滴静注用バッグ3mg デキサート注	1袋 3.3mg	30分
生食250mL イリノテカン150mg/m ²	1瓶	90分
生食20mL	1管	静注

アービタックス

Loading Dose

インフュージョンリアクション注意

(非炎症)

アービタックスと同じ投与速度で

(炎症)

薬剤師: _____

DAY 2(月 日)～ 3(月 日)

DAY16(月 日)～17(月 日)

DAY30(月 日)～30(月 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

DAY8 (月 日) DAY22 (月 日) DAY36 (月 日)

DAY43 (月 日)

薬剤名	投与量	
生食100mL デキサート注	1瓶 6.6mg	30分
ポララミン	3錠内服	
生食100mL	1瓶	30分
生食250mL アービタックス250mg/m ² 【アービタックス1瓶(20mL)中 100mg】	1瓶	1時間
生食100mL	1瓶	30分
経過観察		30分

インフュージョンリアクション注意

(非炎症)

アービタックスと同じ投与速度で

薬剤師: _____

[投与前対象患者]

1. 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん(大腸がん)と診断されていること	[DLF]
2. 免疫組織化学的にEGFR陽性が確認されていること。	イリノテカン
3. アービタックス、トボテシンの成分に対し重篤な過敏症の既往歴がないこと	白血球および下痢(水様便)
4. PS(Performance Status)が0~1である	[今回の投与量] mg/body
5. 前化学療法が無効であること	[累積投与量] mg/body
6. 間質性肺疾患(胸部レントゲン診断)の合併がないこと	[今回の投与量] mg/body
7. 妊娠又は妊娠している可能性のないこと	[累積投与量] mg/body
8. 同意を取得できること。	[今回の投与量] mg/body
9. 骨髄機能抑制がない	[累積投与量] mg/body
10. 感染症を合併していない	
11. 下痢(水様便)がない	
12. 腸管麻痺・腸閉塞がない	
13. 間質性肺疾患または肺線維症がない	
14. 多量の腹水・胸水がない	
15. 黄疸がない	
16. 硫酸アタザナビルを投与されていない	

[投与当日]	PS:0~2							
	発熱がない							
	排便回数の増加がない							
	下痢(水様便)がない							
	腹痛がない							
	WBC	3000~12000						
	RBC	430~560						
	PLT	10万 \leq						
	CRP	\sim 0.3						
	GOT	13~33						
	GPT	8~42						
	LDH	119~229						
	TBil	0.2~1.3						
	Mg	1.7~2.5						
	K	3.5~5.0						
Na	135~146							
Ca	8.7~11							
P	2.5~4.7							

[減量中止基準]

用量調節の目安

Grade3以上の皮膚症状の発現回数	アービタックスの投与	投与延期後の状態	用量調節
初回発現時	投与延期*	Grade2以下に回復	250mg/m ² で継続
		回復せず	投与中止
2回目の発現時	投与延期*	Grade2以下に回復	200mg/m ² で継続
		回復せず	投与中止
3回目の発現時	投与延期*	Grade2以下に回復	150mg/m ² で継続
		回復せず	投与中止
4回目の発現時	投与中止	—	—

* 1~2週間の投与延期

[DLFを除く重大な副作用]

アービタックス ・重度のインフュージョンリアクション[気管支痙攣、蕁麻疹、低血圧、意識消失、ショックを主症状としたアナフィラキシー症状]
 ・重度の皮膚症状 [ざ瘡様皮疹、皮膚の乾燥、亀裂、続発する炎症性及び感染性の症状(眼瞼炎、口唇炎、蜂巣炎、膿胞等)]
 ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]

イリノテカン ・腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞 [腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等]
 ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
 ・ショック、アナフィラキシー様症状 [呼吸困難・血圧低下等]
 ・肝機能障害、黄疸 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
 ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]
 ・肺塞栓症、静脈血栓症 [呼吸困難・チアノーゼ等]

- ・心筋梗塞、狭心症発作〔胸痛・呼吸困難等〕
- ・心室性期外収縮〔脈の乱れ・心電図異常等〕