

[軽吐]ロンサーフ+アバスチン(ベバシスマブ)療法

外科: 管理番号 RSC048

処方医:

適応症: 大腸癌

4週間を1コースとして投与を繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アバスチン	●														●													
ロンサーフ朝		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●															
ロンサーフ夕		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●															

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m²

[投与スケジュール] (_____ コース)

Day1(月 日) Day15(月 日)

本管	
薬剤名	投与量
生食20mL 【ポート使用時】疎通確認 10mL以上のシリンジ使用	10mL
生食100mL アバスチン 5mg/kg (非炎症性) [投与時間注意※] インフュージョンリアクション注意	1瓶
生食20mL 【ポート使用時】フラッシュ 10mL以上のシリンジ使用	10mL

※アバスチン投与時間: 初回90分 2回目: 60分 3回目以降30分

初回投与時は90分、初回の認容性が良好であれば2回目の投与は60分で行ってもよい。

2回目の投与においても認容性が良好であれば、それ以降の投与は30分で投与することができる。

Day2朝(月 日)~Day6夕(月 日) Day9朝(月 日)~Day13夕(月 日)

薬剤名	投与量
ロンサーフ	2×朝夕食後

[投与前・適正使用基準]

1. 重篤な腎障害がない
2. PSが0~1である
3. 活動性の感染症が疑われない
4. 大きな手術を28日以内に施行されていない
5. 消化管穿孔や気管食道瘻を合併していない
6. 喀血(2. 5mL以上の鮮血の喀出)がない
7. 血圧がコントロールされている
8. 血栓塞栓症を現在合併していない
9. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。

NEUT	1500 ≤		
HGB	8. 0 ≤		
PLT	7. 5万 ≤		
TBIL	≤ 1. 5		
GOT	≤ 100(肝転移患者では ≤ 200)		
GPT	≤ 100(肝転移患者では ≤ 200)		
Cr*	≤ 1. 5		
Mg	1. 7~2. 5		
K	3. 5~5. 0		
Na	135~146		
Ca	8. 7~11		
P	2. 5~4. 7		
蛋白尿	2+で投与可		

※day15採血は必須

ロンサーフ投与量

体表面積	初回基準量
1.07㎡未満	35mg/回(70mg/日)
1.07㎡以上1.23㎡未満	40mg/回(80mg/日)
1.23㎡以上1.38㎡未満	45mg/回(90mg/日)
1.38㎡以上1.53㎡未満	50mg/回(100mg/日)
1.53㎡以上1.69㎡未満	55mg/回(110mg/日)
1.69㎡以上1.84㎡未満	60mg/回(120mg/日)
1.84㎡以上1.99㎡未満	65mg/回(130mg/日)
1.99㎡以上2.15㎡未満	70mg/回(140mg/日)
2.15㎡以上	75mg/回(150mg/日)

[ロンサーフ投与中止基準]

	投与再開基準	投与中止基準
HGB	8.0 \leq	<7.0
NEUT	1500 \leq	<1000
PLT	7.5万 \leq	<5万
T-Bil	\leq 1.5	2.0<
AST ALT	施設基準上限の2.5倍以下 (肝転移患者では5倍以下)	施設基準上限の2.5倍を超える (肝転移患者では5倍を超える)
Cr	\leq 1.5	1.5<
末梢神経障害	Grade2以下	Grade3以上
非血液毒性	Grade1以下	Grade3以上

[ロンサーフ減量基準]

前コース中に下記に該当する有害事象が発現した場合には、ロンサーフ投与再開時10mg/日単位で減量する

NEUT	<500
PLT	<5万

[重大な副作用]

《アバステン》

- ・消化管穿孔(突然起こる強い腹痛)
- ・創傷治癒遅延
- ・原発巣からの出血(下血)
- ・肺転移巣からの出血(喀血)
- ・脳転移巣からの出血(突発性の意識障害、神経障害)[頭痛、嘔気・嘔吐、めまい]
- ・動脈血栓塞栓症(心血管障害)[胸痛]
- ・動脈血栓塞栓症(脳血管障害)[突発性の意識障害、神経症状、嘔気・嘔吐、めまい]
- ・高血圧に伴う緊急症(高血圧脳症、高血圧性クリーゼ)[頭痛、視力障害、意識障害、悪心・嘔吐]
- ・可逆性後白室脳症症候群
- ・ネフローゼ症候群(蛋白尿)
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- ・好中球減少症
- ・うっ血性心不全(呼吸困難、乏尿、体重の変化)

《ロンサーフ》

- ・骨髄抑制、感染症
- ・下痢
- ・間質性肺炎