

[軽吐]サイラムザ+パクリタキセル療法(胃)

外科 管理番号 D105

処方医:

適応: 胃癌

4週毎に繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	
サイラムザ	●														●															●
パクリタキセル	●							●							●															●

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m² **心電図モニター必要時あり**

[投与スケジュール] (_____ クール目)

DAY 1 (_____ 月 _____ 日) DAY15 (_____ 月 _____ 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食250mL [2時間30分 点滴静注]	1瓶	【内服】ポララミン錠2mg	3錠
		生食50mL	1瓶
		ファモチジン注20mg	1管
		デキサート	8. 25mg
		[30分 点滴静注]	
		生食250mL	全量250mL
		サイラムザ 8mg/kg	
		[60分 点滴静注] [非炎症性]	
		インフュージョンリアクション注意	
		特に1~2回目	
		タンパク質透過型フィルター(0. 2または0. 22ミクロン)使用	
		生食50mL	1瓶
		[プライミング用]	
		生食250mL	1瓶
		パクリタキセル 80mg/m ²	
		[60分 点滴静注] [壊死性]	
		アレルギー症状注意 特に初~2	
		回投与時 ほぼ10分以内	
		投与中1時間観察	
		生食20mL	1管
		[フラッシュ]	

DAY 8 (_____ 月 _____ 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食250mL [2時間 点滴静注]	1瓶	【内服】ポララミン錠2mg	3錠
		生食50mL	1袋
		ファモチジン注20mg	1管
		デキサート	8. 25mg
		[30分 点滴静注]	
		生食50mL	1瓶
		[30分 点滴静注]	
		生食250mL	1瓶
		パクリタキセル80mg/m ²	
		[60分 点滴静注] [壊死性]	
		アレルギー症状注意 特に初~2	
		回投与時 ほぼ10分以内	
		投与中1時間観察	
		生食20mL	1管
		[フラッシュ]	

[適正使用基準]

- | |
|-----------------------------------|
| 1. PS (Performance Status)が0~2である |
| 2. 二次治療である |
| 3. 血栓塞栓がない |
| 4. 消化管穿孔/消化管の慢性疾患がない |
| 5. 重篤な腎障害がない |
| 6. 出血性素因がない |

[DLF] パクリタキセル:
白血球・好中球
および末梢神経障害
肝障害時用量調節

パクリ

7. 未治癒の術創／手術の予定がない

8. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす			
血液一般検査	WBC (/ μ L)	3500 \leq	
	Neut (/ μ L)	2000 \leq	
	PLT (/ μ L)	10万 \leq	
	HGB (g/dL)	9.0 \leq	
血清生化学検査	AST (IU/L)	正常値上限の3倍以下	
	ALT (IU/L)	正常値上限の3倍以下	
	TBIL (mg/dL)	≤ 1.5	
蛋白尿		1+以下	

[DLFを除く重大な副作用]

《パクリタキセル》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔呼吸困難・胸痛・低血圧・頻脈・徐脈・潮紅・血管浮腫・発汗等〕
- ・急性呼吸窮迫症候群〔呼吸困難・低酸素症・胸部X線異常等〕
- ・間質性肺炎、肺繊維症〔発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常等〕
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全、心伝導障害、肺塞栓、血栓性静脈炎、脳卒中、肺水腫
- ・難聴、耳鳴
- ・消化管壊死、腸管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍〔腹痛・嘔吐・吐血・下血等〕
- ・重篤な腸炎〔激しい腹痛・下痢等〕
- ・腸管閉塞、腸管麻痺〔食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等〕
- ・肝機能障害、黄疸〔食欲不振・倦怠感・黄疸等〕
- ・膵炎〔腹痛・腰背痛・血清アミラーゼ値上昇等〕
- ・急性腎不全〔むくみ・尿量低下・検査値異常等〕
- ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症〔紅斑・発熱・関節痛・下痢等〕
- ・播種性血管内凝固症候群(DIC)

《サイラムザ》

- ・動脈血栓塞栓症
- ・静脈血栓塞栓症
- ・インフュージョンリアクション
- ・消化管穿孔、出血
- ・好中球減少症／白血球減少症
- ・創傷治癒障害
- ・可逆性後白質脳症症候群
- ・高血圧
- ・蛋白尿