

# [軽吐]biweeklyゲムシタビン療法

外科: 管理番号 D308  
処方医:   
適応: 膵臓がん・胆道がん  
2週を1コースとし投与をくりかえす

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GEM	●													

(コース目)

身長: cm 体重: kg 体表面積 m<sup>2</sup>

DAY 1 (月 日)

薬剤名	投与量	
生食100mL デキサート	1袋 6.6mg	30分
生食 100mL ゲムシタビン 1000mg/m <sup>2</sup>	1瓶	30分
生食 20mL	1管	静注

24Gにてルート確保  
(炎症)

薬剤師: \_\_\_\_\_

[適性使用基準]

[DLF] GEM: 骨髄抑制

1. PS (Performance Status)が0~2である		
*2. 重篤な骨髄抑制がない		
*3. 間質性肺炎または肺線維症がない		
*4. 胸部への放射線療法を施行していない		
*5. 重篤な感染症を合併していない		
6. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。		
血液一般検査	* WBC (/μL)	4000~12000
	* Neut (/μL)	2000 ≤
	* PLT (/μL)	10万 ≤
	* HGB (g/dL)	9.5 ≤
	GOT (IU/L)	正常値上限の2.5倍以下
	GPT (IU/L)	正常値上限の2.5倍以下
	TBil (mg/dL)	正常値上限の2倍以下
	BUN (mg/dL)	正常値上限以下
	Cr (mg/dL)	正常値上限以下

ゲムシタビン

[今回の投与量] mg [累積投与量] mg

[DLFを除く重大な副作用]

《ゲムシタビン》

- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・アナフィラキシー様症状 [呼吸困難等]
- ・心筋梗塞 [胸痛・呼吸困難等]
- ・うっ血性心不全 [息苦しさ・むくみ・胸痛等]
- ・肺水腫 [呼吸困難・チアノーゼ等]
- ・気管支痙攣 [呼吸困難・喘鳴等]
- ・成人呼吸促迫症候群 (ARDS) [呼吸困難等]
- ・腎不全 [むくみ・尿量低下等]
- ・溶血性尿毒症症候群 [紫斑・むくみ・尿量低下等]
- ・皮膚障害 [紅斑・水疱・落屑等]