

## [高吐] FOLFIRINOX療法

外科 管理番号 RSE016

処方医:

適応症: 治癒切除不能な膵がん

2週間を1クールとして投与を繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン	●													
レボホリナート	●													
イリノテカン	●													
フルオウラシル(ホーラス)	●													
フルオウラシル(持続)	●	●	●											

身長: \_\_\_\_\_ cm 体重: \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

[投与スケジュール] ( \_\_\_\_\_ クール目)

Day1~3( 月 日 ~ 月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食20mL 10mL以上のシリンジ使用 ポート開通確認	10mL		
<b>【内服】ポラミン錠2mg</b>	<b>3錠</b>		
アロキシ点滴静注用バッグ0.75mg デキサート	1袋 9.9mg		
<b>【30分 点滴静注】</b>			
5%ブドウ糖液50ml	1瓶		
<b>【10分 点滴静注】</b>			
		5%ブドウ糖 250mL オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> <b>【2時間 点滴静注】[炎症性]</b> アレルギー症状注意 複数回以上 ほぼ数分以内	1瓶
			ブライミン <sup>®</sup>
5%ブドウ糖 500mL レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup>	1瓶		
<b>【2時間 点滴静注】</b>		生食500mL イリノテカン 180mg/m <sup>2</sup>	1瓶
		<b>【90分 点滴静注】[炎症性]</b> レボホリナート開始後30分より	
			ブライミン <sup>®</sup>
生食50mL フルオウラシル注 400mg/m <sup>2</sup>	1瓶		
<b>【15分間】[炎症性]</b>			
生食100mL フルオウラシル注2400mg/m <sup>2</sup>	フルオウラシルと生食適量を 混合し140mLとする		
<b>【46時間】[炎症性]</b>			
Day3( 月 日)			
生食20mL 10mL以上のシリンジ使用 ポートフラッシュ	10mL		

DAY2( 月 日)~3( 月 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

[DLF] フルオウラシル:  
白血球減少・口内炎および下痢[DLF] イリノテカン  
白血球及び下痢(水様便)

[DLF] オキサリプラチン

末梢神経障害

フルオウラシルの投与量

[今回の投与量] [累積投与量]

mg/body mg/body

イリノテカンの投与量

[今回の投与量] [累積投与量]

mg/body mg/body

## [適正使用基準]

*1. 口内炎がない	
*2. 下痢がない	
*3. TS-1が投与されていないかまたは投与中止後7日以上経っている	
*4. 重症感染症またはその疑いがない	
*5. 腸管麻痺・腸閉塞がない	
*6. 間質性肺炎または肺線維症がない	
*7. 多量の腹水・胸水がない	

*8. 黄疸がない		オキサリプラチンの投与量	
*9. 硫酸アタザナビルを投与されていない		[今回の投与量]	[累積投与量]
10. PS (Performance Status)が0~2である		mg/body	mg/body
11. 機能障害を伴う重度の感覚異常又は知覚不全がない			
12. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。			
*WBC	(/μL)	4000 ≤	
Neut	(/μL)	1600 ≤	
PLT	(/μL)	15万 ≤	
HGB	(/μL)	11.0 ≤	
GOT	(IU/L)	≤40	
GPT	(IU/L)	≤35	
TBil	(mg/dL)	≤1.2	
BUN	(mg/dL)	≤20	
Cr	(mg/dL)	≤1.1	

[DLF以外の重大な副作用]

#### フルオロウラシル

- ・脱水症状 [激しい下痢等]
- ・出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎 [激しい腹痛・下痢等]
- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等]
- ・白質脳症 [歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等]
- ・うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症 [疲労感・息苦しさ・むくみ・胸痛・胸部圧迫感等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・肝機能障害・黄疸、肝不全 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・消化管潰瘍 [食欲不振・腹痛・吐血・下血等]
- ・急性膵炎 [腹痛・腰背痛・発熱・嘔吐・血清アミラーゼ値上昇等]
- ・意識障害を伴う高アンモニア血症
- ・肝・胆道障害(胆嚢炎、胆管壊死、肝実質障害等) \* 肝動脈内投与時 [腹痛・発熱・黄疸等]
- ・手足症候群 [手掌・足趾の紅斑・疼痛性発赤腫脹・知覚過敏等]
- ・臭覚障害、嗅覚脱失(長期投与症例に多い)

#### イリノテカン

- ・腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞 [腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等]
- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・ショック、アナフィラキシー様症状 [呼吸困難・血圧低下等]
- ・肝機能障害、黄疸 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・急性腎不全 [むくみ・尿量低下等]
- ・肺塞栓症、静脈血栓症 [呼吸困難・チアノーゼ等]
- ・心筋梗塞、狭心症発作 [胸痛・呼吸困難等]
- ・心室性期外収縮 [脈の乱れ・心電図異常等]

#### オキサリプラチン

- ・ショック、アナフィラキシー症状
- ・間質性肺炎、肺繊維症
- ・骨髄機能抑制
- ・溶血性尿毒症症候群
- ・視野欠損、視野障害、視神経炎、視力低下
- ・血栓塞栓症
- ・心室性不整脈、心筋梗塞
- ・肝静脈閉塞症