

# [高吐]mFOLFIRINOX療法

外科 管理番号 RSE021

処方医:

適応症: 治癒切除不能な膵がん

2週間を1クールとして投与を繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン	●													
レボホリナート	●													
イリノテカン	●													
フルオウラシル(ホーラス)	●													
フルオウラシル(持続)	●	●	●											

身長: \_\_\_\_\_ cm 体重: \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

[投与スケジュール] ( \_\_\_\_\_ クール目)

Day1~3( 月 日 ~ 月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食20mL 10mL以上のシリンジ使用 ポート開通確認	10mL		
<b>【内服】ボラミン錠2mg</b>	<b>3錠</b>		
アロキシ点滴静注用バッグ0.75mg デキサート	1袋 9.9mg		
<b>[30分 点滴静注]</b>			
5%ブドウ糖液50ml	1瓶		
<b>[10分 点滴静注]</b>			
		5%ブドウ糖 250mL オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup> <b>[2時間 点滴静注][炎症性]</b> アレルギー症状注意 複数回以上 ほぼ数分以内	1瓶
			ブライミング
5%ブドウ糖 500mL レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup>	1瓶		
<b>[2時間 点滴静注]</b>		生食500mL イリノテカン 150mg/m <sup>2</sup> <b>[90分 点滴静注][炎症性]</b> レボホリナート開始後30分より	1瓶
			ブライミング
生食100mL フルオウラシル注2400mg/m <sup>2</sup>	フルオウラシルと生食適量を 混合し140mLとする		
<b>[46時間][炎症性]</b>			
Day3( 月 日)			
生食20mL 10mL以上のシリンジ使用 ポートフラッシュ	10mL		

DAY2( 月 日)~3( 月 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

[DLF] フルオウラシル:  
白血球減少・口内炎および下痢

[DLF] イリノテカン  
白血球及び下痢(水様便)

[DLF] オキサリプラチン  
末梢神経障害

フルオウラシルの投与量

[今回の投与量] [累積投与量]  
mg/body mg/body

イリノテカンの投与量

[今回の投与量] [累積投与量]  
mg/body mg/body

オキサリプラチンの投与量

[今回の投与量] [累積投与量]  
mg/body mg/body

### [適正使用基準]

*1. 口内炎がない
*2. 下痢がない
*3. TS-1が投与されていないかまたは投与中止後7日以上経っている
*4. 重症感染症またはその疑いがない
*5. 腸管麻痺・腸閉塞がない
*6. 間質性肺炎または肺線維症がない
*7. 多量の腹水・胸水がない
*8. 黄疸がない
*9. 硫酸アタザナビルを投与されていない
*10. PS(Performance Status)が0~2である
*11. 機能障害を伴う重度の感覚異常又は知覚不全がない

12. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。		
*WBC	(/μL)	4000≦
Neut	(/μL)	1600≦
PLT	(/μL)	15万≦
HGB	(/μL)	11.0≦
GOT	(IU/L)	≦40
GPT	(IU/L)	≦35
TBil	(mg/dL)	≦1.2
BUN	(mg/dL)	≦20
Cr	(mg/dL)	≦1.1

[DLF以外の重大な副作用]

#### フルオロウラシル

- ・脱水症状〔激しい下痢等〕
- ・出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎〔激しい腹痛・下痢等〕
- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等〕
- ・白質脳症〔歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等〕
- ・うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症〔疲労感・息苦しさ・むくみ・胸痛・胸部圧迫感等〕
- ・急性腎不全〔むくみ・尿量低下等〕
- ・間質性肺炎〔咳・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- ・肝機能障害・黄疸、肝不全〔食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等〕
- ・消化管潰瘍〔食欲不振・腹痛・吐血・下血等〕
- ・急性膵炎〔腹痛・腰背痛・発熱・嘔吐・血清アミラーゼ値上昇等〕
- ・意識障害を伴う高アンモニア血症
- ・肝・胆道障害(胆嚢炎、胆管壊死、肝実質障害等) \* 肝動脈内投与時〔腹痛・発熱・黄疸等〕
- ・手足症候群〔手掌・足趾の紅斑・疼痛性発赤腫脹・知覚過敏等〕
- ・臭覚障害、嗅覚脱失(長期投与症例に多い)

#### イリノテカン

- ・腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞〔腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等〕
- ・間質性肺炎〔咳・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔呼吸困難・血圧低下等〕
- ・肝機能障害、黄疸〔食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等〕
- ・急性腎不全〔むくみ・尿量低下等〕
- ・肺塞栓症、静脈血栓症〔呼吸困難・チアノーゼ等〕
- ・心筋梗塞、狭心症発作〔胸痛・呼吸困難等〕
- ・心室性期外収縮〔脈の乱れ・心電図異常等〕

#### オキサリプラチン

- ・ショック、アナフィラキシー症状
- ・間質性肺炎、肺繊維症
- ・骨髄機能抑制
- ・溶血性尿毒症症候群
- ・視野欠損、視野障害、視神経炎、視力低下
- ・血栓塞栓症
- ・心室性不整脈、心筋梗塞
- ・肝静脈閉塞症