3週ごとにくりかえす

[中吐]アプラキサン+ゲムシタビン療法(2週投与1週休薬)

外科 管理番号 D441

処方医:

適応:膵臓がん

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

心電図モニター必要時あり

 体表面積
 ㎡ (Mosteller RD式使用)
 インラインフィルター付輸液セットは使用不可

 [投与スケジュール]
 コース目)

 DAY1 (月日)
 日)
 月日)

 本管
 側管

kg

7 8

6

体重:

		7,1	
本管		側管	
薬剤名	投与量		
グラニセトロン点滴静注用バッグ	1袋		
デキサート	9. 9mg		
[30分 点滴静注]			
生食50mL	1瓶		
[30分 点滴静注]			
生食50mL	1瓶		
アブラキサン125mg/m ²		泡立てないように	
(体表面積の計算: Mosteller R		1V20mLで懸濁_5mg/mL調製	
<u>D式使用)</u>		空ボトルへ投与量を注入	
[30分 点滴静注] [壊死性]			

生食50mL	1瓶
[全開 フラッシュ]	
生食100mL	1瓶
ゲムシタビン1000mg/m ²	
[30分 点滴静注] [炎症性]	
生食20mL	1瓶
<u>[フラッシュ]</u>	

DAY2~3(月日~月日) DAY9~10(月日~月日)

	<u></u>	,,
薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

[適正使用基準] 初日

1 2 3 4 5

cm

アブラキサン ゲムシタビン

身長:

1. 重篤な骨髄抑制のない患者 2. 感染症またはその疑い(CRP異常、発熱、白血球増多)がない患者 3. PS (Performance Status)が0~1である 4. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす ≦12000 白血球数 1500≦ Neut $(/ \mu L)$ PLT $(/ \mu L)$ 10万≦ 9. 0≦ **HGB** (g/dL)正常値上限の2. 5倍以下 **AST** (IU/L) 正常値上限の2. 5倍以下 ALT (IU/L) (mg/dL) 正常値上限の1.25倍以下 TBil (mg/dL) ≤ 1.5 心電図が正常である(心疾患・重篤な不整脈がない) 末梢神経障害:≦Grade1 * (初回) ≦Grade2 * (2回目以降)

[DLF]

アブラキサン 骨髄抑制(好中球減少)

ゲムシタビン 骨髄抑制(好中球減少)

[適正使用基準] DAY8、DAY15

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			
1. 重篤/	1. 重篤な骨髄抑制のない患者				
2. 感染	2. 感染症またはその疑い(CRP異常、発熱、白血球増多)がない患者				
3. PS(F	3. PS(Performance Status)が0~1である				
4. 生理	4. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす				
Neut	$(/ \mu L)$	1000≦			
PLT	(/ µ L)	5万≦			
AST	(IU/L)	正常値上限の2. 5倍以下			
ALT	(IU/L)	正常値上限の2. 5倍以下			
TBil	(mg/dL)	正常値上限の1. 25倍以下			
Cr	(mg/dL)	≦ 1. 5			

口腔粘膜炎、		≦Grade2または前コースで≧Grade3が発現							
末梢神経障	害	した	<u>:場合:Gr</u>	ade1/こ	回復後				
	今回		累積			今回	累積		
アブラキサン		mg	mg	5	デムシタビン	mg		mg	
アブラキサン		mg	mg	7	デムシタビン	mg		mg	

減量の目安	アブラキサン	ゲムシタビン
通常投与量	125mg/m ²	1000mg/m²
1段階減量	100mg/ m ²	800mg/ m ²
2段階減量	75mg/ m ²	600mg/ m ²

[重大な副作用]

ゲムシタビン

- •骨髄抑制
- •間質性肺炎
- ・アナフィラキシー様症状
- •心筋梗塞
- ・うっ血性心不全
- ·肺水腫
- •気管支痙攣
- ·成人呼吸促迫症候群(ARDS)
- •溶血性尿毒症症候群
- •皮膚障害
- •肝機能障害、黄疸

アブラキサン

- ・白血球減少等の骨髄抑制
- •末梢神経障害
- •脳神経麻痺、顔面神経麻痺
- ・ショック、アナフィラキシー様症状
- •間質性肺炎、肺線維症
- •急性呼吸窮迫症候群
- ・心筋梗塞、うつ血性心不全、心伝導障害
- ·脳卒中、脳塞栓、肺水腫、血栓性静脈炎
- •難聴、耳鳴
- •消化管壊死、消化管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍
- •重篤な腸炎
- •腸管閉塞、腸管麻痺
- •肝機能障害、黄疸
- •膵炎
- •急性腎不全
- •皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症
- ·播種性血管内凝固症候群(DIC)