

[高吐]FP+RT(放射線)療法(根治・stage I)

外科 管理番号 RSG012

処方医: _____

適応症: 食道癌stageIA(T1N0M0)

下記を4週1コースとして2コース繰り返す

・CDDP 70mg/m²(day1)

・5-FU 700mg/m²(day1-4)

・体外照射30Gy(2Gy/day,day1-21)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
シスプラチン	●																													●
フルオロウラシル	●	●	●	●																										●
放射線	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●											●

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m²

[投与スケジュール] (_____ クール目)

Day1(月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食100mL [穿刺・プライミング]	1瓶	ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
主治医の最終確認後にフルオロウラシル開始		ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
ソリタT3号500mL	1袋	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg デキサート注 [30分 点滴静注]	1袋 9.9mg
フルオロウラシル注 700mg/m ² [24時間 点滴静注][炎症]		生食500mL シスプラチン 70mg/m ² [2時間 点滴静注] [炎症] アレルギー症状注意 6~8回以上ほぼ数分以内	1袋 プライミング
		ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
		マンニトールS300mL [1時間 点滴静注]	1瓶
		フロセミド注20mg [静注]	1管
		ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day2(月 日) Day3(月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
ソリタT3号500mL	1袋	生食100mL	1袋
フルオロウラシル注 700mg/m ² [24時間 点滴静注][炎症]		デキサート注 [30分 点滴静注]	8.25mg
		ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋
		ラクテック500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day4(月 日)

本管	
薬剤名	投与量
ソリタT3号500mL	1袋
フルオロウラシル注 700mg/m ² [24時間 点滴静注][炎症]	

シスプラチン
[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

フルオロウラシル
[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg
[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg
[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg
[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[適性使用基準・投与開始基準]

1. PS (Performance Status)が0～2である							
2. 重篤な感染症を合併していない							
3. 重篤な骨髄抑制がない							
4. 重篤な腎障害がない							
5. 口内炎がない							
6. 下痢がない							
7. 劇症肝炎等の重症な肝障害がない							
8. フルシトシンを投与されていない							
9. TS-1が7日以上のお薬期間がある							
10. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。							
血液一般 検査	WBC	3500 ≤	≤ 12000				
	Neut	2000 ≤					
	PLT	10万 ≤					
	HGB	9.0 ≤					
	GOT	≤ 80					
	GPT	≤ 70					
	TBil	≤ 1.5					
	BUN	≤ 25					
	Cr	≤ 1.1					
	Ccr	80 ≤					
Mg	1.7 ~ 2.5						

シスプラチン

Ccr (mL/min)	60 <	45-60	30-45	< 30
CDDP	100%	75%	50%	中止

[フルオロウラシル]

TBIL < 5	100%
TBIL > 5	中止

[重大な副作用]

《シスプラチン》

- ・急性腎不全
- ・汎血球減少等の骨髄抑制
- ・ショック、アナフィラキシー様症状【発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等】
- ・聴力低下・難聴・耳鳴【聴力低下・難聴・耳鳴】
- ・うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲【視力低下・中心暗点・眼痛】
- ・脳梗塞【意識障害・頭痛・一過性脳虚血発作】
- ・溶血性尿毒症症候群【紫斑・むくみ・尿量低下】
- ・心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈【胸痛・息切れ・動悸・心電図異常等】
- ・溶血性貧血【めまい・たちくらみ・倦怠感】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群【むくみ・痙攣・意識障害】
- ・劇症肝炎、肝機能障害、黄疸【食欲不振・倦怠感・黄疸】
- ・消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔【腹痛・嘔吐・吐血・下血】
- ・急性膵炎【腹痛・腰背痛】
- ・高血糖、糖尿病の悪化
- ・横紋筋融解症【筋肉痛・コーラ尿】

《フルオロウラシル》

- ・脱水症状【激しい下痢等】
- ・出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎【激しい腹痛・下痢等】
- ・ショック、アナフィラキシー様症状【発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等】
- ・白質脳症【歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等】
- ・うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症【疲労感・息苦しさ・むくみ・胸痛・胸部圧迫感等】
- ・急性腎不全【むくみ・尿量低下等】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・肝機能障害・黄疸、肝不全【食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等】
- ・消化管潰瘍【食欲不振・腹痛・吐血・下血等】
- ・急性膵炎【腹痛・腰背痛・発熱・嘔吐・血清アミラーゼ値上昇等】
- ・意識障害を伴う高アンモニア血症
- ・肝・胆道障害(胆嚢炎、胆管壊死、肝実質障害等) * 肝動脈内投与時【腹痛・発熱・黄疸等】
- ・手足症候群【手掌・足趾の紅斑・疼痛性発赤腫脹・知覚過敏等】
- ・臭覚障害、嗅覚脱失(長期投与症例に多い)