

DCF療法

外科 管理番号 D007

処方医:

適応症: 食道癌

3週を1コースとしくりかえす

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	●																				
シスプラチン	●	●	●	●	●																
フルオロウラシル	●	●	●	●	●																

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m² (年 月 日)

[投与スケジュール] (_____ クール目)

Day1(月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食250mL [4. 5時間 点滴静注]	1瓶	アロキシ点滴静注バッグ デキサート注 [30分 点滴静注]	1袋 6.6mg
		生食500mL ドセタキセル60mg/m ² [3時間] [壊死性] アレルギー症状注意 特に初~2回投与時 ほぼ10分 以内 投与中1時間観察	1瓶
		生食100mL シスプラチン6mg/m ² [1時間] [炎症性] アレルギー症状注意 特に初~2回投与時 ほぼ10分 以内 投与中1時間観察	1瓶
ソリタ3号500mL [23時間 点滴静注]	1袋	ソリタ3号500mL フルオロウラシル300mg/m ² [23時間 点滴静注][炎症性]	1袋

Day2(月 日) Day3(月 日) Day4(月 日) Day5(月 日)

薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
ソリタ3号500mL [24時間 点滴静注]	1袋	生食100mL シスプラチン6mg/m ² [1時間] [炎症性] アレルギー症状注意 特に初~2回投与時 ほぼ10分 以内 投与中1時間観察	1瓶
		ソリタ3号500mL フルオロウラシル300mg/m ² [23時間 点滴静注][炎症性]	1袋

DAY1 昼(月 日) ~ DAY3朝(月 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠4mg	1錠	当日昼、翌日朝・昼食後 翌々日 朝食後

ドセタキセル

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

シスプラチン

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

フルオロウラシル

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[今回の投与量] _____ mg [累積投与量] _____ mg

[適性使用基準・投与開始基準]

1. PS (Performance Status)が0~2である

2. 重篤な感染症を合併していない

3. 重篤な骨髄抑制がない

4. 重篤な腎障害がない					
5. 口内炎がない					
6. 下痢がない					
7. フルシトシンを投与されていない					
8. TS-1が7日以上 of 休薬期間がある					
9. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。					
血液一般 検査	WBC	3500 ≤	≤ 12000		
	Neut	2000 ≤			
	PLT	10万 ≤			
	HGB	9.0 ≤			
	GOT	≤ 80			
	GPT	≤ 70			
	TBil	≤ 1.5			
	BUN	≤ 25			
	Cr	≤ 1.1			
	Ccr	80 ≤			
Mg	1.7 ~ 2.5				

[重大な副作用]

《シスプラチン》

- ・急性腎不全
- ・汎血球減少等の骨髄抑制
- ・ショック、アナフィラキシー様症状【発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等】
- ・聴力低下・難聴・耳鳴【聴力低下・難聴・耳鳴】
- ・うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲【視力低下・中心暗点・眼痛】
- ・脳梗塞【意識障害・】・一過性脳虚血発作
- ・溶血性尿毒症症候群【紫斑・むくみ・尿量低下】
- ・心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈【胸痛・息切れ・動悸・】
- ・溶血性貧血 心電図異常等】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群【むくみ・痙攣・意識障害】
- ・劇症肝炎、肝機能障害、黄疸【食欲不振・倦怠感・黄疸】
- ・消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔【腹痛・嘔吐・吐血・下血】
- ・急性膵炎【腹痛・腰背痛】
- ・高血糖、糖尿病の悪化
- ・横紋筋融解症【筋肉痛・コーラ尿】

《フルオロウラシル》

- ・脱水症状【激しい下痢等】
- ・出血性腸炎、虚血性腸炎、壊死性腸炎【激しい腹痛・下痢等】
- ・ショック、アナフィラキシー様症状【発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等】
- ・白質脳症【歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等】
- ・うっ血性心不全、心筋梗塞、安静狭心症【疲労感・息苦しさ・むくみ・胸痛・胸部圧迫感等】
- ・急性腎不全【むくみ・尿量低下等】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・肝機能障害・黄疸、肝不全【食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等】
- ・消化管潰瘍【食欲不振・腹痛・吐血・下血等】
- ・急性膵炎【腹痛・腰背痛・発熱・嘔吐・血清アミラーゼ値上昇等】
- ・意識障害を伴う高アンモニア血症
- ・肝・胆道障害(胆嚢炎、胆管壊死、肝実質障害等) * 肝動脈内投与時【腹痛・発熱・黄疸等】
- ・手足症候群【手掌・足趾の紅斑・疼痛性発赤腫脹・知覚過敏等】
- ・臭覚障害、嗅覚脱失(長期投与症例に多い)

ドセタキセル

- ・骨髄抑制
- ・ショック、アナフィラキシー様症状【呼吸困難・気管支痙攣・血圧低下・胸部圧迫感・発疹等】
- ・間質性肺炎【咳・息切れ・呼吸困難・発熱等】
- ・心不全【呼吸困難・むくみ等】
- ・播種性血管内凝固症候群(DIC)
- ・腸管穿孔、胃腸出血【腹痛・吐血・下血等】
- ・浮腫・体液貯留 心筋梗塞【胸痛・呼吸困難等】