

# dose dense TC療法

婦人科: 管理番号 E8

処方医

適応: 子宮体癌

身長: \_\_\_\_\_ cm 体重: \_\_\_\_\_ kg 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 3週を1コースとして6~9コース

投与	投与	投与	投与
DAY1	DAY8	DAY15	DAY22(1)

[投与スケジュール] ( \_\_\_\_\_ クール目)

DAY 1 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

薬剤量	投与量	
生食250mL	1瓶	180分 本管
ポララミン錠2mg	3錠(内服)	
グラネセトン点滴静注用バッグ3mg	1袋	30分 側管
ファモチジン注20mg	1管	
デキサート	9.9mg	
生食50mL	1瓶	30分 側管
生食250mL	1瓶	60分 側管
パクリタキセル80mg/m <sup>2</sup>		
生食250mL	1瓶	60分 側管
カルボプラチン AUC6		
生食20mL	1管	側管フラッシュ

アレルギー症状注意 特に初~2回投与時 ほぼ10分以内  
投与中1時間観察 (壊死)

アレルギー症状注意複数回以上数分以内 (炎症)

DAY2( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)~3( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

DAY 8 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日) DAY 15 ( \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日)

薬剤量	投与量	
生食250mL	1瓶	120分 本管
ポララミン錠2mg	3錠(内服)	
生食50mL	1袋	30分 側管
ファモチジン注20mg	1管	
デキサート	8.25mg	
生食50mL	1瓶	30分 側管
生食250mL	1瓶	60分 側管
パクリタキセル80mg/m <sup>2</sup>		

[DLF]  
カルボプラチン: 白血球・血小板減少  
パクリタキセル: 白血球・好中球 および末梢神経障害

アレルギー症状注意 特に初~2回投与時 ほぼ10分以内  
投与中1時間観察 (壊死)

### [適正使用基準]

1. PS (Performance Status)が0~2である。			カルボプラチン 腎障害時用量調節 パクリタキセル 肝障害時用量調節
2. ポリオキシエチレンヒマシ油含有製剤に対し過敏症の既往歴がない			
*3. 重症感染またはその疑い(CRP異常、発熱、白血球異常増多)がない。			
4. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。			
血液一般検査	*WBC (/μL)	4000 ≤	心電図モニター必要時あり [今回の投与量]
	*Neut (/μL)	2000 ≤	
	*PLT (/μL)	15万 ≤	
	HGB (g/dL)	11.0 ≤	
血清生化学検査	GOT (IU/L)	≤40	カルボプラチン: _____ mg パクリタキセル: _____ mg [累積投与量] カルボプラチン: _____ mg パクリタキセル: _____ mg [今回の投与量] パクリタキセル: _____ mg
	GPT (IU/L)	≤35	
	TBil (mg/dL)	≤1.2	
	BUN (mg/dL)	≤20	
	Cr (mg/dL)	≤1.1	
心電図が正常である(心疾患・重篤な不整脈がない)			[累積投与量]

### [腎機能を考慮した投与量の調節]

カルボプラチン Calvertの計算式より算出する。

$$\text{投与量 (mg/body)} = \text{目標AUC値} \times (\text{GFR} + 25)$$

\*GRF=Ccrで代用可能。

パクリタキセル:	mg
[今回の投与量]	
パクリタキセル:	mg
[累積投与量]	
パクリタキセル:	mg

[骨髄抑制を考慮した投与量の調節]

パクリタキセル:

WBC4000未満・Neut2000未満で投与中止

前回投与後にWBC1000以下または重篤な末梢神経障害(GradeⅢ以上)を起こしたとき

減量段階	通常	1段階	2段階	3段階
投与量	210mg/m <sup>2</sup>	180mg/m <sup>2</sup>	150mg/m <sup>2</sup>	135mg/m <sup>2</sup>

[DLFを除く重大な副作用]

- 《パクリタキセル》
- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔呼吸困難・胸痛・低血圧・頻脈・発熱・発汗・呼吸困難・胸部X線異常等〕
  - ・間質性肺炎、肺繊維症〔発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常等〕
  - ・急性呼吸窮迫症候群〔呼吸困難・低酸素症・胸部X線異常等〕
  - ・心筋梗塞、うっ血性心不全、心伝導障害、肺塞栓、血栓性静脈炎、脳卒中、肺水腫〔胸痛・むくみ・呼吸困難・チアノーゼ・意識障害等〕
  - ・難聴、耳鳴
  - ・消化管壊死、腸管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍〔腹痛・嘔吐・吐血・下血等〕
  - ・重篤な腸炎〔激しい腹痛・下痢等〕
  - ・腸管閉塞、腸管麻痺〔食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等〕
  - ・肝機能障害、黄疸〔食欲不振・倦怠感・黄疸等〕
  - ・膵炎〔腹痛・腰背痛・血清アミラーゼ値上昇等〕
  - ・急性腎不全〔むくみ・尿量低下・検査値異常等〕
  - ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症〔紅斑・発熱・関節痛・下痢等〕
  - ・播種性血管内凝固症候群(DIC)

- 《カルボプラチン》
- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔チアノーゼ・呼吸困難・胸内苦悶・血圧低下等〕
  - ・脳梗塞〔頭痛・意識障害等〕
  - ・急性腎不全〔むくみ・尿量低下・検査値異常等〕
  - ・麻痺性イレウス〔食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等〕
  - ・間質性肺炎〔発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常等〕
  - ・溶血性尿毒症症候群〔血尿・貧血・検査値異常等〕
  - ・心筋梗塞、うっ血性心不全〔胸痛・むくみ・呼吸困難・チアノーゼ等〕





