

TC(パクリタキセル・カルボプラチン)療法

外科 管理番号 E1

処方医:

適応症:子宮頸がん

3~4週を1コースとして3~6コース

Table with 22 columns (days) and 2 rows (Carboplatin, Paclitaxel) showing treatment schedule with filled circles indicating administration days.

身長: cm 体重: kg 体表面積 m²

[投与スケジュール] (クール目)

心電図モニター必要時あり

Day1(月日)

Main treatment table with columns for '本管' (Main Line) and '側管' (Side Line), detailing drug names and dosages for Day 1.

DAY2(月日)~3(月日)

Table for Day 2-3 treatment, including drug name (Decadron), dosage (8mg), and timing (1x after breakfast).

[DLF] カルボプラチン: 白血球および血小板減少

[適正使用基準]

- 1. PS (Performance Status)が0~2である
2. ポリオキシエチレンヒマシ油含有製剤に対し過敏症の既往歴がない
3. 重症感染症またはその疑い(CRP異常、発熱、白血球異常増多)がない。
4. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。

パクリタキセル 白血球・好中球 および末梢神経障害
カルボプラチン 腎障害時用量調節
パクリタキセル 肝障害時用量調節

Table for laboratory tests including blood general examination (WBC, Neut, PLT, HGB) and serum chemistry examination (GOT, GPT, TBil, BUN, Cr) with reference ranges.

今回 累積

カルボプラチン: mg mg

パクリタキセル: mg mg

[骨髄抑制を考慮した投与量の調節]

パクリタキセル:

WBC4000未満・Neut2000未満で投与中止

前回投与後にWBC1000以下または重篤な末梢神経障害(Grade III以上)を起こしたとき

Table for dose adjustment stages: 減量段階, 通常, 1段階, 2段階, 3段階

投与量	210mg/m ²	180mg/m ²	150mg/m ²	135mg/m ²
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[DLFを除く重大な副作用]

《パクリタキセル》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状【呼吸困難・胸痛・低血圧・頻脈・徐脈・潮紅・血管浮腫・発汗等】
- ・間質性肺炎、肺繊維症【発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常等】
- ・急性呼吸窮迫症候群【呼吸困難・低酸素症・胸部X線異常等】
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全、心伝導障害、肺塞栓、血栓性静脈炎、脳卒中、肺水腫

【胸痛・むくみ・呼吸困難・チアノーゼ・意識障害等】

- ・難聴、耳鳴
- ・消化管壊死、腸管穿孔、消化管出血、消化管潰瘍【腹痛・嘔吐・吐血・下血等】
- ・重篤な腸炎【激しい腹痛・下痢等】
- ・腸管閉塞、腸管麻痺【食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等】
- ・肝機能障害、黄疸【食欲不振・倦怠感・黄疸等】
- ・膵炎【腹痛・腰背痛・血清アミラーゼ値上昇等】
- ・急性腎不全【むくみ・尿量低下・検査値異常等】
- ・皮膚粘膜症候群、中毒性表皮壊死症【紅斑・発熱・関節痛・下痢等】
- ・播種性血管内凝固症候群(DIC)

《カルボプラチン》

- ・ショック、アナフィラキシー様症状

【チアノーゼ・呼吸困難・胸内苦悶・血圧低下等】

- ・脳梗塞【頭痛・意識障害等】
- ・急性腎不全【むくみ・尿量低下・検査値異常等】
- ・麻痺性イレウス
【食欲不振・悪心嘔吐・著しい便秘・腹痛・腹部膨満感等】
- ・間質性肺炎【発熱・咳・呼吸困難・胸部X線異常等】
- ・溶血性尿毒症症候群【血尿・貧血・検査値異常等】
- ・心筋梗塞、うっ血性心不全