

[軽吐]オブジーボ(2W)+ヤーボイ(6W)療法

外科

処方医:

適応: 悪性胸膜中皮腫

6週毎に投与を繰り返す

身長: cm 体重: kg 体表面積 m²[投与スケジュール] () クール目) オブジーボ・ヤーボイはインラインフィルター使用Day1 (月 日) ※ CVポートへの凝集対策として最終濃度を1.9mg/mL以上で調製

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食50mL 穿刺・プライミング用	1瓶	オブジーボ・ヤーボイはインラインフィルター使用	
生食50mL オブジーボ※1 [30分 点滴静注](非炎症性) インフュージョンリアクション注意 特に初回～2回に注意	1瓶 240mg		
生食50mL [30分 点滴静注]	1瓶		
生食50mL ヤーボイ 1mg/kg [30分 点滴静注](非炎症性) インフュージョンリアクション注意 特に初回～2回に注意 生食50ml容器使用。全量30mL に調整。	全量30mL	ヤーボイ: インラインフィルター使用(0.2～1.2μmのメンブランフィルター) 希釈は1～4mg/mLの濃度で行う ●体重30kg未満の場合は1mg/mLに調整 ●体重120kg越える場合は全量40mLに調整	
生食注シリンジ10mL [静注]	1本		

※ CVポートへの凝集対策として最終濃度を1.9mg/mL以上で調製

Day15 (月 日)Day29 (月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食50mL 穿刺・プライミング用	1瓶	オブジーボはインラインフィルター使用	
生食50mL オブジーボ※1 [30分 点滴静注](非炎症性) インフュージョンリアクション注意 特に初回～2回に注意	1瓶 240mg		
生食50mL [フラッシュ]	1瓶		

[適正使用基準]

1. 他の抗悪性腫瘍剤と併用でない。術後補助化学療法でない。			
2. PS(Performance Status)0～1が望ましい			
3. 2つ以上の化学療法歴がある			
4. 妊婦又は妊娠している可能性がない			
5. 自己免疫性疾患の既往が無い又は家族歴が無い(慎重投与)			
6. 間質性肺炎がない又は既往がない(慎重投与)			
7. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす			
血液一般検査	WBC	≥ 3, 000/mm ³	
	Neut	≥ 1, 500/mm ³	

	PLT	≥ 100, 000/mm ³	
	HGB	≥ 9. 0g/dL	
血清生化学検査	GOT・GPT	施設基準値上限の3倍以下	
	TBIL	施設基準値上限1. 5倍以下	
	クレアチニン	≤ 1. 5mg/dL	
尿検査	蛋白、糖 etc...	施設正常値内	
	血糖値	随時血糖288mg/dL以下	
	TSH、FT-4	施設正常値内(月に1回検査)	

[重大な副作用]

《オプジーボ》

- ・間質性肺疾患 〔発熱・咳・呼吸困難等〕
- ・重症筋無力症、心筋炎、筋炎、横紋筋融解症
- ・大腸炎、重度の下痢
- ・1型糖尿病
- ・免疫性血小板減少性紫斑病
- ・肝機能障害、肝炎
- ・甲状腺機能障害
- ・神経障害
- ・腎障害
- ・副腎障害
- ・脳炎
- ・重度の皮膚障害
- ・静脈血栓塞栓症
- ・infusion reaction

《ヤーボイ》

- ・大腸炎
- ・重度の下痢
- ・肝不全、肝機能障害
- ・重度の皮膚障害
- ・下垂体炎。下垂体機能低下症
- ・甲状腺機能低下症
- ・副腎機能不全
- ・末梢神経障害
- ・間質性肺疾患
- ・筋炎
- ・心筋炎
- ・infuion reaction