

リュープリンPRO 22.5mg療法

外科

処方医:

適応: 乳癌

24週(168日)日毎に投与

術後: 2年(標準)~5年

進行・再発: 病勢の進行を認めるまで

身長: cm

体重: kg

体表面積: m²

DAY1	DAY168	DAY336	DAY504
●	●	●	●

[投与スケジュール]

1回目	(月 日)	2回目	(月 日)
3回目	(月 日)	4回目	(月 日)
5回目	(月 日)	6回目	(月 日)
7回目	(月 日)	8回目	(月 日)
9回目	(月 日)	10回目	(月 日)
11回目	(月 日)	12回目	(月 日)
13回目	(月 日)	14回目	(月 日)
15回目	(月 日)	16回目	(月 日)
17回目	(月 日)	18回目	(月 日)
19回目	(月 日)	20回目	(月 日)

薬剤名	投与量	
リュープリンPROキット22.5mg	1キット	皮下注

上腕部、腹部、臀部の皮下

注射部位は毎回変更し、同一部位への反復注射は行わない

[適正使用基準]

1. 妊娠又は妊娠している可能性がない
2. 授乳中の婦人ではない
3. 本剤の成分又はLH-RH作動薬に対し過敏症の既往歴がない

[重大な副作用]

- ・間質性肺炎〔咳・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- ・アナフィラキシー様症状〔血圧低下・呼吸困難・喘鳴・蕁麻疹・不快感等〕
- ・肝機能障害、黄疸
- ・糖尿病の発症または増悪
- ・下垂体卒中