

[高吐]シスプラチン+イリノテカン(胃)併用療法

外科
処方医:
適応:胃癌
4週を1コースとし投与をくりかえす

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
シスプラチン	●																											
イリノテカン	●														●													

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m²

[投与スケジュール] (_____ クール目)

Day1(月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
ラクテック 500mL [2時間 点滴静注]	1袋		
ラクテック 500mL 硫酸Mg注(1mEq/mL) [点滴静注 2時間]	1袋 8mL(8mEq)		

パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg デキサート注 [30分 点滴静注]	1袋 9.9mg
生食500mL イリノテカン注 70mg/m ² [90分 点滴静注](炎症性)	1袋
生食500mL(全満量注意) シスプラチン注 80mg/m ² [2時間 点滴静注](炎症性)	1袋

アレルギー症状注意6~8回以上ほぼ数分以内

ブライミング

ラクテック 500mL [2時間 点滴静注]	1袋
マンニトール 300mL [1時間 点滴静注]	1瓶
フロセミド注20mg [静注]	1管
ラクテック 500mL [2時間 点滴静注]	1瓶

Day2(月 日) Day3(月 日)

薬剤名	投与量
生食100mL デキサート注 [30分 点滴静注]	1瓶 8.25mg
ラクテック 500mL [2時間 点滴静注]	1袋
ラクテック 500mL [2時間 点滴静注]	1袋

Day15(月 日)

薬剤名	投与量
生食50mL グラニセトロン注 デキサート注 [30分 点滴静注]	1瓶 1管 9.9mg
生食500mL イリノテカン注 70mg/m ² [90分 点滴静注](炎症性)	1袋
生食注シリンジ10mL [静注]	1本

[DLF]

Day16(月 日) Day17(月 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

[適正使用基準]

1. PS(Performance Status)が0~2である
2. 重篤な感染症を合併していない
3. 重篤な骨髄抑制がない

イリノテカン 白血球及び下痢(水様便)
シスプラチン 腎障害・悪心・嘔吐・
骨髄抑制
シスプラチン: 腎障害時用量調節

4. 重篤な腎障害がない				
5. 劇症肝炎等の重症な肝障害がない				
6. 5-FUを投与されていない				
7. フルシトシンを投与されていない				
8. TS-1が7日以上以上の休薬期間がある				
9. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。				
血液一般検査	WBC (/μL)	3500 ≤ ≤ 12000		
	Neut (/μL)	2000 ≤		
	PLT (/μL)	10万 ≤		
	HGB (g/dL)	9.0 ≤		
血清生化学検査	GOT (IU/L)	≤ 80		
	GPT (IU/L)	≤ 70		
	TBil (mg/dL)	≤ 1.5		
	BUN (mg/dL)	≤ 25		
	Cr (mg/dL)	≤ 1.1		
	Ccr (mg/dL)	80 ≤		
	Mg	1.7~2.5		

[今回の投与量]
シスプラチン mg
イリノテカン mg
[累積投与量]
シスプラチン mg
イリノテカン mg
[今回の投与量]
イリノテカン mg
[累積投与量]
イリノテカン mg

シスプラチン

Ccr (mL/min)	60<	45-60	30-45	<30
CDDP	100%	75%	50%	中止

[DLFを除く重大な副作用]

イリノテカン

- ・腸管穿孔、消化管出血、腸閉塞〔腹痛・吐血・下血・腹部膨満感等〕
- ・間質性肺炎〔咳・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔呼吸困難・血圧低下等〕
- ・肝機能障害、黄疸〔食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等〕
- ・急性腎不全〔むくみ・尿量低下等〕
- ・肺塞栓症、静脈血栓症〔呼吸困難・チアノーゼ等〕
- ・心筋梗塞、狭心症発作〔胸痛・呼吸困難等〕
- 〔紅斑・発熱・関節痛・下痢等〕
- ・白質脳症〔歩行時のふらつき・四肢末端のしびれ感・舌のもつれ感等〕
- ・臭覚脱失

シスプラチン

- ・ショック、アナフィラキシー様症状〔発疹・チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下等〕
- ・聴力低下・難聴・耳鳴〔聴力低下・難聴・耳鳴〕
- ・うっ血乳頭、球後視神経炎、皮質盲〔視力低下・中心暗点・眼痛〕
- ・脳梗塞〔意識障害・頭痛〕
- ・溶血性尿毒症症候群〔紫斑・むくみ・尿量低下〕
- ・心筋梗塞、狭心症、うっ血性心不全、不整脈〔胸痛・息切れ・動悸・〕
- ・溶血性貧血 心電図異常等〕
- ・間質性肺炎〔咳・息切れ・呼吸困難・発熱等〕
- ・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群〔むくみ・痙攣・意識障害〕
- ・劇症肝炎、肝機能障害、黄疸〔食欲不振・倦怠感・黄疸〕
- ・消化管出血、消化性潰瘍、消化管穿孔〔腹痛・嘔吐・吐血・下血〕
- ・急性膵炎〔腹痛・腰背痛〕
- ・高血糖、糖尿病の悪化
- ・横紋筋融解症〔筋肉痛・コーラ尿〕