

[軽吐]トラスツズマブ療法(進行・再発)(胃)

外科:

処方医

適応: 胃癌(進行再発療法)

身長: _____ cm
体重: _____ kg
体表面積: _____ m²

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 投与 | 投与 | 投与 | 投与 | 投与 | 投与 | 投与 |
| DAY1 | DAY22 | DAY43 | DAY64 | DAY85 | DAY106 | DAY127 |
| DAY148 | DAY169 | DAY190 | DAY211 | DAY232 | DAY253 | DAY274 |
| DAY295 | DAY316 | DAY337 | DAY358 | DAY379 | | |

トラスツズマブ Loading Dose

[投与スケジュール] (_____ クール目)
DAY 1 (_____ 月 _____ 日)

| 薬剤名 | 投与量 | |
|-------------------|-----|-----|
| カロナル2錠投与 (初回、2回目) | | |
| 生食250mL | 1瓶 | 90分 |
| トラスツズマブ8mg/kg | | |
| 生食注シリンジ10mL | 2本 | 静注 |

定期的心機能評価

インフュージョンリアクション注意
特に初~2回に注意
特に投与後1時間まで観察
(非炎症性)

DAY 22 (_____ 月 _____ 日)

| 薬剤名 | 投与量 | |
|-------------------|-----|------|
| カロナル2錠投与 (初回、2回目) | | |
| 生食250mL | 1瓶 | 90分* |
| トラスツズマブ6mg/kg | | |
| 生食注シリンジ10mL | 2本 | 静注 |

定期的心機能評価

インフュージョンリアクション注意
特に初~2回に注意
特に投与後1時間まで観察
(非炎症性)

(_____ クール目) (_____ クール目) (_____ クール目)
DAY 43 (_____ 月 _____ 日) DAY 64 (_____ 月 _____ 日) DAY 85 (_____ 月 _____ 日)

(_____ クール目) (_____ クール目) (_____ クール目)
DAY106 (_____ 月 _____ 日) DAY127 (_____ 月 _____ 日) DAY148 (_____ 月 _____ 日)

(_____ クール目) (_____ クール目) (_____ クール目)
DAY169 (_____ 月 _____ 日) DAY190 (_____ 月 _____ 日) DAY211 (_____ 月 _____ 日)

(_____ クール目) (_____ クール目) (_____ クール目)
DAY232 (_____ 月 _____ 日) DAY253 (_____ 月 _____ 日) DAY274 (_____ 月 _____ 日)

(_____ クール目) (_____ クール目) (_____ クール目)
DAY295 (_____ 月 _____ 日) DAY316 (_____ 月 _____ 日) DAY337 (_____ 月 _____ 日)

(_____ クール目) (_____ クール目)
DAY358 (_____ 月 _____ 日) DAY379 (_____ 月 _____ 日)

| 薬剤名 | 投与量 | |
|---------------|-----|------|
| 生食250mL | 1瓶 | 90分* |
| トラスツズマブ6mg/kg | | |
| 生食20mL | 1管 | 静注 |

インフュージョンリアクション注意
特に初~2回に注意
特に投与後1時間まで観察

* 忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。(非炎症性)

《トラスツズマブ》・Infusion reaction: アナフィラキシー様症状、肺障害 [チアノーゼ・呼吸困難・血圧低下・浮腫等]

- ・間質性肺炎 [咳・息切れ・呼吸困難・発熱等]
- ・白血球減少、好中球減少、血小板減少、貧血 [出血(紫斑)・立ちくらみ・発熱等]
- ・肝不全、黄疸、肝炎、肝障害 [食欲不振・倦怠感・黄疸・検査値異常等]
- ・腎障害 [むくみ・尿量低下・検査値異常等]
- ・昏睡、脳血管障害、脳浮腫 [意識障害等]
- ・敗血症 [発熱・皮下出血等]