

[中吐]CapeOX+Nivo療法

外科
 処方医:
 適応症: 胃癌(HER2陰性、切除不能・再発)
 3週間を1コースとして投与を繰り返す

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
オキサリプラチン	●																					●
ニボルマブ	●																					●
カペシタビン 朝		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
カペシタビン 夕	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●

身長: _____ cm 体重: _____ kg 体表面積 _____ m²

[投与スケジュール] (_____ コース)

Day1(月 日)

本管		側管	
薬剤名	投与量	薬剤名	投与量
生食注シリンジ10mL 【ポート使用時】フラッシュ 10mL以上のシリンジ使用	2本		
生食50m プライミング用	1瓶		
		生食50m プライミング用	1瓶
		生食100mL ニボルマブ※ 【30分以上 点滴静注】 (非炎症性) インフュージョンリアクション注意 特に初回～2回に注意	1瓶 360mg
		生食50mL フラッシュ	1瓶
5%ブドウ糖 100mL グラニセトロン注3mg デキサート注 ポララミン注5mg 【30分 点滴静注】	1瓶 1管 9.9mg 1管		
5%ブドウ糖 50mL ルート内洗浄	1瓶		
		5%ブドウ糖 250mL オキサリプラチン 130mg/m ² 【2時間 点滴静注】【炎症性】 アレルギー症状注意 複数回以上 ほぼ数分以内	1袋 プライミング
生食注シリンジ10mL 【ポート使用時】フラッシュ 10mL以上のシリンジ使用	2本		

オキサリプラチン
 [今回の投与量] [累積投与量]
 _____ mg/body _____ mg/body

DAY2(月 日)～3(月 日)

薬剤名	投与量	
デカドロン錠	8mg	1×朝食後

Day1夕食後(月 日)～Day15朝食後(月 日)

薬剤名	投与量	
カペシタビン		2×朝夕食後

[投与前・適正使用基準]

1. PS 0～1であることが望ましい
2. フッ化ピリミジン中止後7日以内の患者ではない
3. 重篤な腎障害がない
4. HER2陰性の切除不能な進行又は再発胃癌である
5. 間質性肺炎の合併または既往がない(慎重投与)
6. 生理機能が十分に保持され、下の基準を満たす。
WBC (/ μ L) 3000 \leq

Neut	(/ μ L)	1500 \leq	
PLT	(/ μ L)	7.5万 \leq	
HGB	(g/dL)	9.0 \leq	
TBIL	(mg/dL)	施設基準上限の1.5倍以下	
GOT	(IU/L)	正常値上限の3倍未満	
GPT	(IU/L)	正常値上限の3倍未満	
Cr*	(mg/dL)	\leq 1.65	
蛋白、糖 etc...		施設正常値内	
血糖値		随時血糖288mg/dL以下	
TSH、FT-4		施設正常値内(月に1回検査)	

CapeOXの減量時の投与量(ARRTACTION-4)

減量レベル	オキサリプラチン(mg/m ²)	カペシタビン(mg/m ² /回)
初回投与量	130	1000
1段階減量	100	750
2段階減量	85	500
3段階減量*	投与中止	投与中止

* 又は、Grade3の感覚性末梢神経毒性が直前のサイクルから持続:オキサリプラチンのみ

CapeOXの減量基準

項目	有害事象 基準	次回投与量	
		オキサリプラチン	カペシタビン
血小板数減少	<50,000/mm ³	1段階減量	1段階減量
好中球数減少	<1,000/mm ³	1段階減量	1段階減量
発熱性好中球減少症	Grade \geq 3	1段階減量	1段階減量
その他の非血液毒性	Grade \geq 2	-	休薬*
	Grade \geq 3	1段階減量	-
末梢神経障害	直前のサイクルから継続するGrade2	1段階減量	-
	7日以上継続するGrade3	投与中止	-
	直前のサイクルから継続するGrade3	投与中止	-

* カペシタビンに起因するGrade2以上の非血液毒性が発現した場合は、Grade1以下に回復するまで休薬し、減量して再開することとする。

[重大な副作用]

オキサリプラチン

- ・末梢神経障害
- ・ショック、アナフィラキシー症状 【発疹・そう痒・気管支痙攣・呼吸困難・血圧低下等】
- ・間質性肺炎、肺繊維症 【発熱・咳・呼吸困難等】
- ・骨髄機能抑制 【検査値異常等チェック】
- ・溶血性尿毒症症候群
- ・視野欠損、視野障害、視神経炎、視力低下
- ・血栓塞栓症
- ・心室性不整脈、心筋梗塞 【脈のみだれ・息苦しさ・心電図異常・胸痛】
- ・肝静脈閉塞症